


TV. C. 144^B

40755A/1

L. xxviii. 19

Pharmacopœia

Brussels









PHARMACOPŒIA
BRUXELLENSIS.

Harrewyn fecit

42600

PHARMACOPOEA
BRUXELLENSIS
SENATUS
AUTHORITATE
MUNITA.
EDITIO ALTERA.



BRUXELLIS,
Typis Viduæ FOPPENS.

Cum Approbatione.

[1739]

BRUXELLES

2011

STATIUM

А Т И У М

EDIZIONE ALTERNATA



BRUNNEN



NOBILISSIMO
AMPLISSIMOQUE
SENATUI
BRUXELLENSI

*Nobilissimi Amplissi-
mique Domini,*

Emendatiorem
Pharmacopœam in lu-
cem edituri non diu
hæsimus dubii cui po-
tissi-

* 3

DEDICATIO.

tissimùm nomini
eam dedicaremus :
Etenim cùm vos &
Civium Vestrorum
incolumitati studio
indefesso prospicere
& saluti omnibus mo-
dis consulere, & ut
florentes ac beati vi-
tam agant paternâ be-
nevolentiâ curare non
desinatis, alia auspicia
quàm Vestra, aliud-
que patrocinium non
potuit opus hoc jam
pulchrius renascens
desi-

DEDICATIO.

desiderare. Nam san-
tati & vitæ tum Ve-
stræ, quæ nobis, tum
Vestrorum Civium
quæ vobis tam chara
est mirificè prospicit,
dum quo pondere
quâ mensurâ compo-
sitiones & mixturæ
vel ad tollendos mor-
bos vel ad præservan-
dam à morbis valetu-
dinem vel ad curanda
vulnera fieri debeant,
accuratè, breviter ac
dilucidè præscribit.

DEDICATIO.

Non licet in his sine
valetudinis aut etiam
vitæ periculo errare.
His diligenter serva-
tis medela speranda
est & corporum sani-
tas, quæ ad publicum
bonum augendum
ornandumque con-
ducit. Vestris itaque
prodit auspiciis, à Ve-
stro nomine splendo-
rem autoritatemque
accipiet, nec Zoïlo-
rum dentes, Vestro
tutum patrocinio o-
pus

DEDICATIO.

pus mole exiguum,
utilitate magnum
pertimescet: hoc vo-
bis addito veteri illo
ὑγιαίνειν καὶ εὐπεράττειν,
suosque pariter labo-
res Machaoniamque
artem consecrant

*Nobilissimi, Amplissi-
mique Domini,*

Humillimi Clientes

COLLEGII MEDICI ASSESSORES.

EXTRACTUM

*Ex Mandato Nobiliss. & Ampliss.
Magistratûs super hoc Dispensatorium.*

UT sit ordo generalis & uniformitas in dispensatione remediorum in omnibus hujus Urbis Pharmacopoliis, mandat NOBILISS. & AMPLISS. SENATUS, quòd omnes Pharmacopœi inposterum teneantur sequi hoc Dispensatorium à *Coll. Med. Assess.* dicti Senatûs autoritate evulgatum, omnesque in eo contentas compositiones sic conficere & in officinis asservare sub multâ duodecim florenorum pro quacunque compositione quæ aliter facta, in visitatione officinarum suo tempore facienda invenietur, interim in casu difficultatis, vel dubii, quod iidem Pharmacopœi teneantur Colleg. Med. consulere antequàm pro arbitrio suo aliquid mutare possint. Publicatum Bruxellis die 20. Martii 1702.

Signatum C. ZEGHERS.



BENEVOLO LECTORI.



*H*Æc est tertia Pharmacopœa nostræ facies, quam necessitas extorsit. Cum ultimæ Editionis nulla amplius extarent Exemplaria, nos ad aliam evulgandam accingere coacti fuimus. Quapropter hanc damus non novam; sed ultimam hinc inde emendatam, & commodiori Typo recusam, eundem ubique ordinem secuti. Multa tamen studio omisimus quæ nullo modo, vel raro in praxi erant, ne nimium Pharmacopœorum officinæ expensis inutilibus gravarentur, multa autem quæ in usu quotidiano erant, & quæ in altera desiderabantur adjecimus, ut ubique uniformitas tam necessaria in dispensandis remediis hac in Urbe conservaretur; quod & non leve
hujus

AD LECTOREM.

hujus Editionis argumentum fuit. Paucis instructa remediis officina satisfacere potest, cum nullus Medicorum sit, in praxi versatus (si plura desideret) quin ex tempore & ad libitum quascumque Compositiones concinnare possit. Si quibus autem Tyronibus ea nimis jejuna esse videatur, discant nos tantum Dispensatorium proponere, & discant sub Magistris in arte peritis laborare; si quid prolixius voluerint, adeant Autores gravissimos qui eâ de re ex professo scripserunt, quos consulere poterunt. Nos contenti fuimus regulam seu normam ponere secundum quam officina nostra hac in Urbe semper instructa esse debent. Interim benevole Lector, si quæ menda irrepserint quas evitare non est facile, eas ut benigne corrigere velis, precamur. Vale & frueri.

J. M.

CARA-

CARACTERES CHYMICI

Acetum	✠	Mora
Acet. destillatum	⊕	Ignis
Aër	Δ	Jupiter
Æs Viride	⊕	Luna
Alembicus	XX	Mars
Alumen	O	Massa
Amalgama	āāā	Mercurius
Antimonium	♂	Merc. precipitatus
Aqua	▽	Merc. sublimatus
Aqua fontis	F	Nitrum
Aqua fortis	F	Nax
Aqua Regia	R	Oleum
Aqua Ros.	R	Plumbum
Arena	∴	Precipitare
Argentum	☾	Pulvis, Pulverare
Argent. vivum	♀	Retorta
Arsenicum	∞	Sal Armoniacum
Auripigmentum	∞	Sal Commune
Aurum	⊙	Sal Gemma
Balneum	B	Sol
Baln. Mariæ	MB	Spiritus
Bolus Armena	AB	Stannum
Calx viva	♀	Stimmi. Antim.
Cancer	♂	Strat. sup. Strat.
Caput mort.	⊙	Sublimare
Calcanth. vitriol	⊕	Sulphur
Calybs	♂	Tartarum
Calybis limatura	♂	Terra
Cineres	♀	Venus
Cinnabaris	⊕	Vinum
Cucibul.	✠	Vitriolum
Destillare	☿	Urina
ies	⊙	

✠
 Δ
 ♀
 ♂
 ⊕
 XX
 O
 āāā
 ♂
 ♀
 F
 R
 R
 ∴
 ☾
 ♀
 ∞
 ∞
 ⊙
 B
 MB
 AB
 ♀
 ♂
 ♂
 ⊕
 ♂
 ♂
 ♀
 ⊕
 ✠
 ☿
 ⊙

1907

P O N-

PONDERA MEDICA ET MENSURÆ.

Granum	Significatur	per G. vel gr.
Obolus,	℥ss.	} et pendet {
Scrupulus,	℥j.	
Drachma,	℥j.	
Semuncia,	℥ss.	
Uncia, per	℥j.	
Sesquiuncia,	℥j. ss.	
Libra,	lib. ss.	
Libra,	lib. j.	
Sesquilibra,	lib. j. ss.)	}

Manipulus est, quantum manu comprehendi potest, et significatur per M. j.

Pugillus est, quantum tribus digitis capi potest, et exprimitur per Pug. j.

Sunt præterea Medicis familiares, aliæ abbreviationum notæ: utpotè

V.	} id est {	numero.
la.		ana. i. cujusque vel singulorum.
par.		paria.
part. æq.		partes æquales.
s.		quantum sufficit.
a.		secundum artem.
B. M.		Balneum Mariæ vel Maris.



PHARMACOPOEA BRUXELLENSIS.

CLASSIS PRIMA.

De Simplicibus Officinalibus.

Radices.

A Cori five Calami aromatici officinarum.

Alcannæ.

Althææ.

Angelicæ.

Apîi.

Ari.

Aristol. longæ.
rotundæ.
tenuis.
fabaceæ.

Asari.

Asparagi.

Bistortæ.

Bryoniæ.

Caryophyllatæ.

Chelidoniæ.

Chinæ.

Cichorei.

Consolidæ majoris.

Contra-yervæ.

Costi.

Cucumeris asinini.

Curcumæ.

Cyclaminis.

Cynoglossi.

Cyperî longi.

rotundi.

Dictamni albi.

Doronici Romani.

Eryngii.

Ebuli.

Esulæ utriusque.

Filicis.

A

Fœni-

2 P H A R M A C O P O E A

Fœniculi.
 Galangæ.
 Gentianæ.
 Glycyrrhyzæ.
 Graminis.
 Helenii.
 Hellebori albi.
 nigri.
 Hermodactylorum.
 Ialappæ.
 Imper. *sive* Ostrutii.
 Iridis Florentinæ.
 Mandragoræ.
 Mechoacannæ.
 Meu.
 Nymphææ.
 Ononidis.
 Osmundæ regalis *fi-*
 ve Filicis palustris.
 Pæoniæ maris.
 Pentaphylli.
 Petasitidis.
 Petroselini.
 Peucedani.
 Phu *sive* Valerianæ.
 Polypodii quercini.
 Pyrethri.
 Rhabarbari.
 Rhapontici.
 Rubiæ tinctorum.
 Rusci.
 Spicæ nardi Celticæ.
 Indicæ.
 Saxifragiæ.

Scyllæ.
 Scorzoneræ.
 Scrophulariæ.
 Tormentillæ.
 Turbith.
 Tussilaginis.
 Vineetoxici.
 Zarsæ parillæ.
 Zedoariæ.
 Zinziberis.

Fungi.

A Garicus.
 Auriculæ Judæ.
 Orbicularis. *Belgiæ*
 Bovist.

Cortices.

A Rantiorum.
 Capparum.
 Cassiæ lignæ.
 China Chinæ.
 Cinnamomi.
 Citriorum.
 Fraxini.
 Glandium calices.
 Granatorum.
 Guajaci.
 Macis.
 Tamarisci.
 Winterani.

Ligna

Ligna.

A Loës.
Aspalathum.
Guajacum.
Nephriticum.
Rhodium.
Santalum album.
 citrinum.
 rubrum.
Saffaphras.
Visci quercini.

*Folia, &
Herba.*

A Brotani maris.
Absynt. vulgaris.
 Romani.
Adianthi albi,
 Nigri.
Agrimonix.
Alchimillæ.
Althææ.
Anethi summitates.
Arthemisæ.
Betonicæ.
Botryos.
Calaminthæ.
Capilli Veneris,

Cardui benedicti.
Centaurei minoris
 summitates.
Ceterach.
Chamædrios.
Chamæpiteos.
Cuscutæ cum flori-
 bus.
Dictamni cretici.
Epithymi.
Erysimi.
Eupatorii cannab.
Euphrasæ cum flo-
 ribus.
Farfaræ *sive* Tussi-
 laginis.
Fumarix.
Hyperici summit.
Hyssopi.
Lavendulæ.
Lauri.
Lupuli.
Majoranæ.
Malvæ.
Marrubii *sive* Prassy.
Matricariæ.
Melissæ.
Menthastri.
Menthæ crispæ.
 aquaticæ.
Mercurialis.
Nepethæ.
Ocymi f. Basilici.

Origani cretici.
vulgaris.

Parietariæ.

Perficariæ.

Phyllitidis.

Pilosellæ.

Pimpinellæ.

Polii montani.

Polygoni.

Polytrichi *ſeu* Tri-
chomanis.

Pulegii.

Pulmonariæ.

Pyrolæ.

Quercus.

Rosmarini.

Rutæ.

Rutæ murariæ.

Sabinæ.

Salviæ.

Saniculæ.

Satureiæ.

Scabioſæ.

Scolopendrii.

Scordii.

Senæ.

Serpilli.

Thymi cum flor.

Tuffilaginis ſ. far-
faræ.

Verbaſci.

Verbenæ.

Veronica.

Violariæ.

Virgæ aureæ.

Flores.

B Alauſtiorum.

Betonicæ.

Bugloſſæ.

Borraginis.

Calendulæ.

Chamomeli vulg.

Romani.

Caryophylli *ſeu* Tu-
nicæ.

Crocus.

Geniſtæ.

Lavendulæ.

Liliorum conval-
lium.

Malvæ arboreæ ,
hortenſis.

Meliloti.

Nymphææ albæ.

Pæoniæ.

Papaveris erratici.

Rosmarini.

Rosarum rubrar.

Salviæ.

Sambuci.

Schænantum.

Stœchados.

Tiliæ.

Verbaſci.

Vio-

Violarum.

Semina.

A Cetosæ.
 Agni casti.
 Althææ.
 Ammios.
 Amomi.
 Anethi.
 Anisi.
 Apii.
 Aquilegiæ.
 Asparagi.
 Atriplicis.
 Bardanæ.
 Berberis.
 Bombacis.
 Cannabis.
 Cardamomi mino-
 ris.
 Cardui benedicti.
 Carui.
 Caulium.
 Ciceres rubri.
 Citri.
 Citrulli.
 Cnici *sem* Carthami.
 Coriandri.
 Cubebæ.
 Cucumeris.
 Cucurbitæ.
 Cumini.
 Cydoniorum.

Dactylorum ossa.

Dauci cretici.

Vulgaris.

Endiviæ.

Eruca.

Fœniculi.

Fœnugræci.

Fumariæ.

Genistæ.

Grana paradisi.

Hordeum integrum.

mundatum.

perlatum.

Hyperici.

Hyoscyami albi.

Lactucæ.

Levistici.

Lini.

Lupini.

Malvæ.

Melonum.

Milii solis.

Napi *sive* Buniadis.

Nasturtii.

Nigellæ.

Nuclei cerasorum.

persicorum.

Ocymi.

Orobi.

Pæoniæ.

Papaveris albi.

nigri.

Petrosel. Vulgaris.

Macedon.

A 3

Plan-

6 P H A R M A C O P O E A

Plantaginis.
 Portulacæ.
 Psyllii.
 Raphani.
 Rusci.
 Rutæ.
 Santonici.
 Saxifragiæ.
 Scariolæ.
 Sefelios massiliensis.
 Sileris montani.
 Sinapi.
 Sophiæ.
 Staphidis agriæ.
 Sumach.
 Thlaspios.
 Urticæ.

Fructus.

Alkekengi seu Halicacabi.
 Amigdalæ amaræ
 dulces.
 Baccæ juniperi.
 lauri.
 myrthi.
 sambuci.
 Berberis.
 Capita papaveris.
 Carpobalsamum.
 Caryophylli.
 Cassia fistularis.
 Colocynthis.

Dactili.
 Ficus.
 Gallæ.
 Glandes.
 Jujubæ.
 Kermes grana *five*
 Coccus Baphica.
 Myrobal. belliricæ.
 Chebulæ.
 Citrinæ.
 Emblicæ.
 Indæ.

Myrtilli.
 Nuces cupressi.
 Moschataæ.
 Pistachiæ.
 Vomicæ.
 Passulæ majores.
 minores.

Piper album.
 longum.
 nigrum.
 Pruna.
 Sebesten.
 Siliquæ dulces.
 Tamarindi.

Farina.

A Mylum.
 Fabarum.
 Fœnugræci.
 Hordei.
 Lupinorum.

Radi-

Radicum althææ.
 Consolidæ majoris.
 Semen lini.
 Volatilis.

Succi liquidi.

A Grestæ seu om-
 phacium.
 Berberorum.
 Cydoneorum.
 Granatorum acid.
 Limonum.

*Succi condensati, Gummi, &
 Resina*

A Cacia vera.
 Aloe Hepatica.
 Succotrina.
 Ammoniacum.
 Assa foetida.
 Balsamum peruvia-
 num.
 Bdellium.
 Benzoinum.
 Bitumen Judaicum.
 Caphura.
 Colophonia.
 Elaterium.
 Eupatorii mesue
 succus.

Euphorbium.
 Galbanum.
 Ghittajemou seu
 gutta gamandra.
 Glycyrrizæ succus.
 Gummi arabicum.

Caranna.
 Ceraforum.
 Elemmi.
 Juniperinū.
 Tacamaha-
 ca.

Hypocistidis succus.
 Lacca.
 Ladanum.
 Liquid-ambar.
 Manna.
 Mastiche.
 Myrrha.
 Opium.
 Opoponax.
 Pix.

Resina Abietina.
 Laricea.
 Pini.
 Therebin-
 thina.

Saccharum album.
 rubrum.
 candum.

Sagapenum.
 Sanguis draconis
 Sarcocolla.
 Scammonium.

PHARMACOPŒA

Styrax calamita.
liquida.

Succinum album.
Citrinum.

Tartarum vini albi.

Thus.

Tragacantha.

*Animalia , eo-
rum partes &
excrementa.*

A Deps anseris.
canis.
cervi.
felis.
hominis.

Afelli.

Axungia porci.

Bezoar occidentalis.
orientalis.

Cancrorum fluvia-
tilium oculi.

Cantharides.

Castoreum.

Cera alba.
flava.

Cornu cervi.

Cranium humanum

Ebur.

Hirci sanguis præ-
par.

Ichthyocolla.

Mandibulæ lucæ
piscis.

Mel.

Moschus.

Mumia.

Os è corde cervi.

Sanguifugæ.

Scincus.

Sepiæ os.

Sevum hircinum.

Sperma ceti.

Spodium ex ebore.

Ungula Alcis.

Unicornu

Zibettum.

*Mineralia , Me-
talla, & Lapides.*

A Labastrum.

Ærugo.

Æs ustum.

Alumen rupeum.

plumeum.

ustum.

Antimonium.

Argentū foliaceum.

vivum.

Arsenicum.

Auri pigmentum.

Aurum foliaceum.

Bolus armenus.

albus.

vulgaris.

Borax

Borax.	Sal armoniacus.
Calx viva.	Gemmæ.
Cerussa.	Petræ <i>sive</i> Nitrum.
Chalcitis.	Sapphyrus.
Chalybs.	Sardus
Chrysocolia.	Smaragdus.
Cinnabaris.	Sulphur.
Cryſtallus.	Terra lemnia.
Granatus.	Thutia officinarum.
Hyacinthus.	Vitriolum album.
Lapis armenius.	Cypreum.
calaminaris.	Viride.
hæmatites.	Vitrum antimonii.
judaicus.	<i>Marina.</i>
lazuli.	A Mbra grisea.
Lithargyrus argenti.	Corall. alb.
auri.	rubr.
Magnes.	Corallina.
Minium.	Margaritæ.
Osteocolia.	Pumex.
Plumbum uſtum.	Spongia.
Pompholyx.	
Rubinus.	

De quibusdam nuncupationibus
plura unô titulô comprehen-
dentibus.

Quinque Radices Aperientes.

Apîi.

Asparagi.

Fœniculi.

10 P H A R M A C O P O E A
Petrofelini.
Rusci.

Quatuor Herba Emollientes.

Althæa.
Beta, *vel* Parietaria.
Malva.
Violaria.

Quinque Herba Capillares.

Capillus Veneris.
Phillyris, *seu* Lingua cervina.
Polytrichum, *seu* Trichomanes.
Ruta muraria.
Scolopendrium, *seu* Ceterach.

Tres Flores Cordiales.

Borraginis.
Buglossæ,
Violarum.

Quatuor Semina Calida Majora.

Anisi.
Cardamomi.
Cumini.
Fœniculi.

Quatuor Semina Calida Minora.

Ammios.
Apii.
Carui.
Dauci.

Qua-

Quatuor Semina Frigida Majora.

Cucumeris.

Cucurbitæ.

Citrulli.

Melonum.

Quatuor Semina Frigida Minora.

Cichorei.

Endiviæ.

Lactucæ.

Portulacæ.

*Quinque Lapidum Pretiosorum
Fragmenta.*

Granati.

Hyacinthi.

Sapphiri.

Serdi, seu Carneoli.

Smaragdi.

*De quorundam simplicium
Collectione.*

Radices evellendæ sunt, quando nec nimis molles, nec nimis duræ, nec lignosæ.

Herbæ colligendæ sunt, quando folia magnitudine, colore & odore vigent; idque cælo sereno, & tempore meridiano.

Flores decerpendi sunt in vigore suæ maturitatis; non dehiscentes, aut decidui.

Flo-

Flores Rosarum ante apertionem avellantur, quando Conserva ex iis conficienda.

Fructus priusquam decerpantur, justam maturitatem habeant ; nisi datâ operâ immaturi desiderentur, ut Mespila, Sorbi &c. Deinde exsiccandi sunt in aëre vel sole ; & si opus fit, in clibano post panis exemptionem. Quod si unâ vice exsiccati non sint, postridiè denuò immittantur.

Semina colligantur, quando sunt matura, & fructus, quibus includuntur, justam maturitatem ceperunt. Et in loco sicco, non calido, ad usum servantur.

Cortices sunt avellendi, quando arbores in pleno vigore sunt. Crassiores manu avellantur, si leviter adhæreant : sin tenacius ferro abscindantur. Tenues verò & Membranosi, ut Sambuci, Fraxini, &c. cultello abradantur.





CLASSIS SECUNDA

De Aquis Simplicibus, Compositis, Spiritibus, Tincturis, Acetis, & Decoctis.

Aquæ Simples stillatitiæ.

A *Rthemisifæ.*
Borraginis.
Cardui benedicti.

Chicorei.

Foeniculi.

Florum Liliorum convallium.

Rosarum.

Sambuci.

Tilia.

Melissæ.

Menthæ.

Plantaginis.

Primulæ Veris.

Salviæ.

Scordii. &c.

Omnes hæ affusâ s. q. aquæ communis post debitam digestionem cum s. q. tartari factam. Per Vesicam destillantur.

Aquæ Cerasorum nigrorum.

Cochleariæ.

Spermatis ranarum.

Per se s. a. in B. M. ex alembico vitreo destillari debent.

Aqua

Aqua Mellis.

℞. *Mellis q. s.*

Ut decima pars cucurbitæ repleatur cum vitreo Alembico & in B. bulliente destilletur aqua : Cum autem guttæ incipiunt acescere vase arenæ imposito, igne aucto liquor secundus & tertius extrahatur.

DE AQUIS COMPOSITIS.

Aqua Anti-Scorbutica.

℞. *Rad. Raphani sylv.**Herb. Cochleariæ.**Nasturtii aq. an. lib. I.**Beccab.**Trifolii aq. an. lib. ss.*

Contusis affunde

*Vini albi lib. VIII.**Spirit. Vini lib. II.*

& sine præviâ fermentatione destill. f. a
ad lib. VII.

Aqua Catharralis.

℞. *Florum Salviæ**Rorismar.**Lavendulæ recent. sed modice siccæ**Garyophyl.**Nucis mosch.**Cinnam. acuti an. Unc. II.**Gran. Paradisi.**Macis.**Rad. Zedoariæ.**Sem. Coriandri.**Piperis*

Piperis longi.

nigri an. Unc. I.

Fol. Ruthæ.

Absinthij recent. sed modice sicc. an. dr. II.

Pomum aurantium incisum unum.

contusis contundendis infunde per plures dies in

Vini Rhenani lib. VIII.

Vini Hispan. lib. IV.

& per refrigeratorium destillentur.

Aqua Cinnamomi.

℞. *Cinnamomi electi & contusi lib. ℥.*

Vini albi generosi lib. IV.

Tartari crudi Unc. II.

Macerentur per dies aliquot in loco tepido postea additâ.

Aquæ Melissæ lib. I.

destill. s. a. in arenâ.

Aqua Embryonum.

℞. *Nucis mosch. Unc. III. ℥.*

Macis Unc I. ℥.

Garyophyll.

Cinnam. acuti.

Zinziberis.

Cubebærum.

Gran. Paradisi.

Zedoariæ an. Unc. II.

Galangæ drach. VI.

Croci orient. Unc. ℥.

Flor. Tunicæ.

Tiliæ an. recent. lib. I.

Herb.

Herb. Salvia cum flor.

Carui.

Fœniculi.

Verbena.

Flor. Lavendulae an. recent. Unc. III.

Rad. Pœoniae maris.

Sem. ejusdem.

Visci quercini veri an. Unc. II.

*Incisa & contusa crassiuscule infunde in
Vini Canarini lib. XII.*

Aqua Lilior. convall. sine addit. aqua.

Simpl. in B. M. destillatae.

Spirit. Fragorum an. lib. I. ꝯ.

Aqua Salviae.

*Fœniculi sine addit. aq. simpl. destil.
an. lib. I.*

*Stent in infusione loco tepido per mensem.
Postea destill. in B. M. ad medias.*

Aqua Epileptica.

℞. Florum Lilior. convall. m. X.

Tiliae m. IV.

Vini Hispan. lib. VIII.

*Fiat infusio per dies aliquot mox destill. in
balneo quo usque flores in fundo cucurbitae
fere aridi relinquuntur deinde*

℞. Cinnam. acuti drach. VI.

Nucis mosch. Unc. ꝯ.

Piperis longi.

Cubeb. an. drach. II.

Flor. Lavendulae Unc. I. ꝯ.

Rosmar.

Stachad. an. drach. VI.

Visci quercini veri.

Rad.

Dictamni nost. an. Unc. ss.

Omnia crassiusculè contrita rursus in superiori Vino per dies octo macerentur postmodum destill. s. a. ad medias.

Aqua Hysterica.

℞. *Rad. Bryoniae Siccata.*

Baccar. Samb. matur. lentofurni calore exsicc. & à stipit. mundat. an. Unc. II.

Fol. Arthem.

Dictam. Cres.

Matricariae.

Nepetae.

Ocymi.

Pulegy.

Ruthae.

Sabinae an. Unc. ss.

Cortic. aurant. exter. siccata. Unc. I. ss.

Myrrhae.

Castorei an. Drach. III.

Croci Drach. I.

Pulverisata macerent. per octiduum in

Spirit. Vini dephlegmati lib. IV.

Deinde colentur per Setaceum densissimum.

Aqua Prophylactica.

℞. *Rad. Angelicae.*

Zedoar. an. Unc. I.

Petasit. Unc. II.

Fol. Ruta Hortens. Unc. IV.

Melissae.

Scabiosae.

B

Flor.

Flor. Calendulæ an. Unc. II.

Nucum Jugland. immatur. concis. lib. II.

Pomor. Citrior. concis. recent. lib. I.

Contusis affunde

Aceti Vini destillati lib. XII.

Digerantur per noctem mane destill. igne cinerum lento penè ad siccitatem, idque sine ustione.

Aqua Theriacalis Simplex.

Rx. Theriacæ recent. Unc. IV.

Spirit. Vini dephlegmati Unc. XX.

Digerantur simul per tres dies in B. M. dein clarum à spisso per decantationem separa.

Aqua Vitæ compos.

Rx. Cinnamomi acuti drach. VI.

Nucis mosc. Unc. ss.

Garyophyll.

Rad. Zedoariæ

Zinziberis

Cubebæ.

Cardamom. minor.

Ligni Santal. rubri

Spicæ nardi

Stæchad. Arab. an. drach. I.

Rad. Galang. drach ss.

Fol. Rosmar.

Majoranæ siccæ. an. scrup. II.

Cortic. Aurant. siccæ. drach. II. ss.

Flor. Rosar. rubr.

Lavendulæ

Anthos an. drach. III.

Contusis contund. affunde

Spirit.

Spirit. Vini depblegmati lib. IV.

Digere leni calore per dies aliquot & postea liquor decantetur.

Aqua Vitæ Aulica.

℞. *Rad. Enulæ Camp. Unc. III.*

Galangæ

Anisorum an. Unc. I. ℥.

Croci drach. III.

Calaminthæ m. II. ℥.

Pulegij

Dictamni Cretici

Majoranæ

Arihemisicæ

Agrimoniæ an. m. I. ℥.

Garyophyllorum drach. III.

Incidenda incidantur & terenda terantur deinde affunde!

Spiritus Vini optimi lib. VI.

Destill. per alembicum Vitreum, destil latis adde

Aquæ Melissæ Unc. IX.

Cinnamomi Unc. VII.

Sacchari albi lib. ℥.

In Vase optimè clauso servetur ad usum,

Spiritus Carminativus.

℞. *Rad. Angelicæ drach. I.*

Imperat.

Galangæ an. drach. I. ℥.

Fol. Rosmar.

Majoranæ

Ruthæ Hortensis

Basiliconis

Summit. Centaurii minoris an. m. ℥.

Baccar. Lauri drach. III.

Semin. Angelicæ

Levistici

Anisi an. Unc. ℥.

Zinziberis

Nacis mosch.

Maceris an. drach. I. ℥.

Cinnam. acuti drach. VI.

Garyophyll.

Corticum Aurant. fccat. an. drach. I.

Spirit. Vini Unc. XXXX.

Digerantur simul & postea s. a. destillentur.

Aqua seu Elixir antifebrile.

℞. *Garyophyll. Unc. IV.*

Mithridatii Unc. III.

Spiritus Vini lib. VI.

Digerantur simul calidè per dies aliquot
postea liquor filtretur, cui adde

Camphoræ Unc. II. ℥.

Olei Juniperi drach. VI.

Sal. Volatil. C.C. Unc. ℥.

Et circulando in calore leni fiat exacta
mixtio & dissolutio.

Spiritus Aromaticus Oleosus

Seu

Sal Volatile Oleosum.

℞. *Foliorum Majoranæ*

Menthæ

Salviæ fccat. an drach. V.

Florum Lavendulæ drach. III.

Cortic. exterior. Citri

Aurant. an. Unc. II.

BRUXELLENSIS. 21

Cinnamomi acuti Unc. I. ꝯ.

Nucis moschata

Maceris an. drach VI.

Garyophyllor. Unc. ꝯ.

Sem. Cardamomi min.

Carui an drach. II.

Salis Tartari

Armoniaci an. Unc. IV.

Spiritus Vini lib. IV.

F. infusio per dies aliquot & destillentur
ex arenâ s. a.

Spiritus Vini Camphoratus.

R. *Spiritus Vini dephlegmati lib. I.*

Camphoræ Unc. I.

Misce simul.

Spiritus Vini Rectificatus.

R. *Spiritus Vini q. v.*

Destilletur per Alemb. in B. M. quod to-
ties repetatur donec pulverem tormenta-
rium accendere possit.

Spiritus Ardentes.

Cochleariæ

Menthæ

Melissæ

Baccar. Sambuci

Juniperi

Cerasor. nigror.

Fragorum &c.

R. *Fol. aut Fructuum supradict. q. v.*

Ferment. & destil. s. a. quæ postea debite
rectific.

22 PHARMACOPŒA
DE TINCTURIS.

Tinctura Croci.

℞. *Croci Unc. I.*
Spiritus Vini rectific. lib. ꝯ.
Extrahatur f. a. Tinctura.

Tinctura Cinnamomi.

℞. *Cinnamomi optimi Unc. II.*
Spiritus Vini rectific. Unc. VIII.
Extrah. f. a. Tinctura.

Tinctura Castorei.

℞. *Castorei pulveris Unc. I.*
Spiritus Vini rectific. Unc. VIII.
Salis Tartari Drach I.
Digerantur per sex dies & demum filtrando clarum à spisso separa.

Tinctura Gummi Laccæ.

℞. *Gummi Laccæ Unc. ꝯ.*
Aluminis usti drach. I.
Spiritus Cochleariæ ultimo exstillantis
Unc. VIII.

Phialæ arctè inclusa digerantur in arenâ ,
donec Tinctura satis rubicunda appareat,
quæ leniter effundatur.

Tinctura Opii.

Seu

Laudanum Liquidum Tartarifat.

℞. *Opii Thebaici Unc. I.*
Croci drach. II.
Cinnamomi

Gery-

Garyophyll.

Macis

Nucis moschatae an. drach. ff.

Salis Tartari drach. I.

Spiritus Vini rectificati lib. I.

Digerantur per dies aliquot, postea liquor
filtretur & ad dimidium exhaletur.

Tinctura Salis Tartari.

Rx. Salis Tartari Unc. VI.

Calcinetur violento igne donec ceruleus evadat, quod fit spatio trium vel quatuor horarum. Ferè refrigeratum crucibulum frangatur. Massa exempta teratur. Huic pulveri adhuc calenti superfunde alcohol Vini ad supereminentiam duorum vel trium digitorum, digerantur simul donec colore rubro tinctus appareat spiritus, quem effunde & separa.

Tinctura Succini.

Rx. Succini. flavi in pollinem redacti Unc. IV

Spirit. Vini rectific. lib. I.

Digerantur simul per dies aliquot ad Succini solutionem, deinde decant. filtret. & tertiam partem in B. M. abstrahatur.

Elixir Proprietatis.

Rx. Myrrhæ electæ.

Aloës lucidæ.

Croci an. Unc. I.

Affunde liquorem nitri fixi ad madefactionem, digerantur simul per dies aliquot in B. M. postea adde

Alcohol. Vini Unc. X.

Tincturam per dies duodecim digerendo
& circulando extrahe, quam postea decanta.

Præparatur etiam alio modo hoc Elixir
humectando species supradictas Spiritu
Vini alcoholisato & addendo spiritus sul-
phuris per campanam q. s. procedendo ut
suprà.

D E A C E T I S.

*Acetum Calendulae**Rosarum rubrarum**Sambuci &c.*

Fiunt eodem modo

R. Florum Sicc. lib. ss.

Aceti Vini acerrimi lib. IV.

Infolentur æstivis caloribus in Vase vitreo
optimè clauso, dein abjectis floribus Ace-
tum reponatur.

Acetum Stillatitium.

R. Aceti Vini acerrimi q. v.

Destilletur ex Cucurbitâ vitreâ in B.M.
vel cineribus lenissimo calore, primo as-
cendit phlegma, ferè ad quartam partem
liquoris, quod exstillavisse cognosces aci-
do odore & sapore. Tùm muta recipiens,
& collige Acetum destillatum, continua
destillationem, donec Spiritus omnes as-
cenderint.

Acetum Scylliticum.

R. Tunic. Scyllæ leviter exsiccatae Unc. IV.
Aceti Vini lib. IV.

Misce

Misce in Vase vitreo benè clauso & infolentur æstivis caloribus.

Acetum Theriacale.

R2. Rad. Petasitidis Unc. III.

Scorzonera,

Angelica,

Zedoaria,

Succisæ. an. Unc. II.

Herb. Petroselini Macedonici,

Scordii,

Galega,

Ruthæ hortensis ana. Unc. I. ꝯ.

Baccarum Juniperi,

Herbæ Paridis ana Unc. I.

Cortic. Citri exteriorum Unc. III.

Flor. Calendulæ siccatorum Unc. ꝯ.

Croci Orientalis drach. II.

Myrrha electæ,

Cinnamomi optimi ana Unc. II.

Macis Unc. I. ꝯ.

Theriaca Andromachi Unc. II.

Incisa & contusa immittantur vasi vitreo;
quibus super affunde

Aceti Vini acerrimi lib. X.

Et vase rectè obturato, servantur ad usum.

Acetis subjungi possunt, Oxycratum, seu
Posca, & Oxyrhodinum.

Oxycratum constat parte unâ Aceti, &
sex aquæ.

Oxyrhodinum paratur ex parte unâ Aceti
rosati, & tribus partibus Olei rosati.

26 P H A R M A C O P O E A
DE DECOCTIS.

Decoctum Hordei.

℞. *Hordei mundati Unc. II.*

Aque communis lib. XII.

Coque ad tertiæ partis consumptionem.

Cremor Hordei.

℞. *Hordei perlati Unc. II.*

Aque communis q. s.

Decoque igne lento, donec ferveſcant, tum abjectâ priori aquâ, nova addatur, coquendo per quatuor vel quinque horas: deinde trajiciatur per ſetaceum, trajecto adde ſacchari albi, & aquæ Roſarum ana quantum ſatis.

Hordeatum Amygdalinum.

℞. *Decocti Hordei Unc. X.*

Amygdalarum dulcium per aquam ferventem mundatarum Unc. ſſ.

Piſtentur in mortario marmoreo & addita ſacchari albi & aquæ Roſarum quantitate ſufficiente, ſ. Hordeatum Amygdalinum.

Simili modo fiunt emulſiones ex ſeminibus frigidis majoribus, ſ. a. mundatis.

Ptiſana Communis.

℞. *Hordei integri Unc. I. ſſ.*

Aque communis lib. VIII.

Coque ad medias ſub finem adde

Liquiritæ ræſæ drach. IV.

Ani-

Anisorum drach. I.

Fiet Passulata, si inter coquendum addatur passularum mundatarum Unc. I. ss.

Decoctum Cordiale, Medicinæ.

℞. *Hordei mundati pug. I.*

Pruna Damascena Num. IV.

Uvarum passarum exacinar. Unc. ss.

Glycyrrhizæ rasæ drach. I. ss.

Flor. Borraginis,

Buglossi,

Violarum ana pug. I.

Anisorum drach. I.

Aquæ fontis lib. III.

Decoque s. a. ad tertiæ partis consumptionem, colatura servetur ad usum.

Decoctum solutivum.

℞. *Superioris colaturæ lib. I.*

Fol. Sennæ mundatorum drach. VI.

Anisorum contusorum drach. II.

Effervescent leviter, & sine Colatura ferventur ad usum.

Decoctum Pectorale.

℞. *Hordei mundati Unc. ss.*

Uvarum passarum enucleatar. drac. VI.

Sebesten,

Fujubas ana Num. X.

Dactylos Num. VI.

Caricas pingues Num. IV.

Rutæ murariæ,

Scabiosæ,

Tussilaginis ana m. ss.

Hyssopi.

*Hyssopi pug. I.**Glycyrrhizæ rasæ drach. II.*

Coquantur in lib. VIII. aquæ Fontis,
ad medias.

Decoctum Clysteris Emolliens

℞. *Fol. Malvæ,*

Althææ,

Violaris,

Betæ,

Mercurialis an. m. I.

Coquantur s. a. in sufficienti quantitate
aquæ communis ad libras duas, colaturâ
servetur ad usum, herbæ sint semper re-
centes, si fieri possit.

Decoctum Carminativum.

℞. *Herb. Origani,*

Pulegii,

Summitatum Thymi an. m. ss.

Semen Anisi,

Carui,

Cumini;

Fœniculi an. drac. III.

Flor. Chamomeli,

Summitatum Anethi an. m. ss.

Uvarum passarum exacinarum

Unc. I.

Bulliant leviter in aquæ lib. III. colatura
servetur usui.

Decoctum Nephriticum.

℞. *Rad. Eryngii,*

Ononidis an. Unc. ss.

Herdei

Hordei mundati Unc. II.

Cicerum rubrorum Unc. III.

Caricas pingues Num. IX.

Sebesten Num. VII.

Glycyrrhizæ rasæ drach. VI.

Semin. Malvæ,

Althææ an. drach. III.

Quat. frigidorum majorum an. drach. II.

Coquantur in aquæ fontis libris decem,
ad libras sex.

Decoctum Vulnerale.

℞. Rad. Consolidæ majoris ficut.

Alkannæ. i. Anchusæ,

Tussilaginis,

Rubiæ tinctorum an. drach. III.

Fol. Meliss.

Millefolii.

Saniculæ,

Pyrolæ,

Betonicæ

Agrimoniæ,

Bugulæ,


Alchimillæ,

Veronicæ an. m. ℥.

Oculorum Cancris contusorum Unc. II.

Spermatis Cati drach. I.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad
libras sex, addendo sub finem vini Rhe-
nani libras duas.



CLASSIS TERTIA

De Syrupis, Mellitis & Looch.

Syrupus Hederæ terrestris.

℞. *Succi hederæ terrestris depurati lib. VI.*
Sacchari albissimi lib. IV.

Clarific. album. Ovor. & f. f. a. Syrupus.
 Eodem modo fiunt Syrupi.

Ex Succis	Borraginis,
	Chicorei,
	Endiviæ,
	Rubi Idæi,
	Scabiosæ,
	Tussilaginis &c.

Similiter ex Succis non acidis.

Syrupus ex Succo Limonum.

℞. *Succi Limonum recent. Express. & per*
subsidentiam depurati lib. I.

Sacch. albiss. clarific. & ad consistent.
cocti lib. II.

Misceantur f. a. in vase fictili & f. Syrupus.
 Simili ferè modo conficiuntur Syrupi

Ex Succis	Agrestæ,
	Aurantiorum,
	Berberis,
	Granator. acidor.
	dulcium,
	Ribesiorum &c.

Et

Et ex reliquis succis Acidis clarific. alios plus alios minus, alios non eoquendo pro naturâ acredinis quod artifici relinquimus.

Syrupus de Absynthio.

℞. *Absynthii vulg. lib. ℥.*
Rosar. rubr. Unc. II.
Spicæ Indiæ drach. III.
Vini veteris optimi.
Succi Cidoniorum an. lib. III. ℥.

Incisis incidend. immittantur cucurbitæ, quibus affund. vinum & succus cydon. fiat per horas 24 in arenâ maceratio, tum igne aucto ac opposito capitello f. destill. liquoris spirituosus ad Unc. X. circiter, qui asservetur. Refrigeratâ Cucurbitâ species in fundo relictæ exprimantur. Expressum album. ovi clarific. cum.

Sacchari albi lib. II.

Coq. ad Syrupi consist. crassior. cui demum sola dissolutione admisce liquorem spirituosorem reservatum & f. s.a. Syrupus.

Syrupus de Althæâ.

℞. *Rad. Althææ recentium Unc. II.*
Cicerum rubrorum Unc. I.
Rad. Graminis,
Asparagi,
Liquiritiæ,
Passularum exacinarum an. Unc. ℥.
Cymarum Althææ,
Malvæ,
Helxines, five Parietariæ,
Pimpinellæ minoris,
Plan-

*Plantaginis majoris ,
Polytrici ,*

Rutæ murariæ an. manip. I.

*Quatuor seminum frigidorum major.
frigid. minor. an. drach. III.*

Coquantur f. a. in aquæ communis lib.

IX. ad remanentiam lib. VI. colaturæ clarificatæ adde

Sacchari albißimi lib. IV.

Fiat ex arte Syrupus.

Syrupus de Arthemisia.

R. Rad. Fœniculi ,

Helenii ,

Iridis ,

Levistici ,

Pæoniæ ,

Rubiæ tinct. an. Unc. ss.

Herb. Arthemisiæ m. II.

Betonicæ ,

Calaminthæ ,

Chamædrios ,

Chamepiteos ,

Hyssopi ,

Hyperici ,

Majoranæ ,

Matricariæ ,

Melissæ ,

Nepetæ ,

Origani ,

Præssii ,

Pulegii ,

Sabinæ an. m. I.

Sem. Anisi ,

Dauci

Danci,
Fœniculi,
Nigellæ,

Ocymi,

Petroselinii,

Rutæ an. drach. III.

Cinnamomi Unc. I.

Spicæ Indicæ drach. III.

Contund. & incid. grosso modo, dein macer. per duos dies in *j. q. Hydromelitis vinosi dilutioris*, postea per *B. M.* Separetur aqua spirituosâ, quâ seorsim exceptâ, reliquiæ ulterius coquantur *s. a.*, colatura cum

Sacchari lib. V.

percoquantur in Syrupum crassum, ut postea permisceri queat aquæ spirituosæ asservatæ.

Syrupus Capillorum Veneris.

R. Capillorum Veneris, vel ejus defectu Ruta murariæ m. III.

Polytrici aurei, vel ejus loco Trichomanes,

Saxifragiæ,

Betoniciæ,

Pimpinellæ,

Asplenii an. m. II.

Coquantur ex aquæ fontis lib. VIII. donec ad quinque redeant, in expresso clarificato dissolve.

Sacchari albissimi lib. III. ss.

Mellis optimi depurati lib. ss.

Fiat *s. a.* Syrupus.

Notandum hîc, ut etiam ubicumque requiritur *Ruta muraria*, vel *Polytricum*,
 C herbam

34 P H A R M A C O P O E A
herbam semper recentem intelligi, aliàs ea
non præstat, quæ intendit Medicus.

Syrupus de Cichoreo compositus

℞. *Hordei integri*,
 Rad. Apii,
 Fœniculi,
 Asparagi an. Unc. II.
 Herb. Cichorei m. III.
 Endiviæ Domesticiæ,
 silvestris,
 Taraxaci an. m. II.
 Cicerbitæ,
 Fumariæ,
 Polytrici,
 Asplenii,
 Salviæ vitæ,
 Summitatum Lupulorum an. m. I.
 Fructuum recentium Alkekengi,
 Radicum Glycyrrhizæ an. drach. VI.
 Aquæ fontis lib. XII.

Coquantur ordine debito ad lib. VIII. in
colaturâ clarificatâ dissolve

Sacchari albissimi lib. VI.

Percoquantur f. a. in Syrupum.

Syrupus de Cortice Citri.

℞. *Cortic. exterior. citri recent. Unc. X.*
 Gran. Kermes drach. II.
 Aquæ fontis lib. VI.

Infunde per noctem, & postea per B. M.
separetur aqua spirituosâ ad Unc. X. quâ
seorsim exceptâ, reliquiæ ulteriùs coquan-
tur ad lib. III. colaturâ cum

Sac-

BRUXELLENsis. 35

Sacchari albiſſimi lib. II. clarificatâ,
Coque in Syrupum craſſum, cui poſteâ
admiſceatur aqua ſpirituoſa.

Syrupus de Eryſimo.

℞. *Fol. Eryſimi recent. m. VI.*
Rad. Helenii,
Tuſſilag.
Liquirit.
Paſſular. exacin.
Hordei integri an. Unc. II.
Herb. Borrâg.
Cichorei,
Capill. Ven. an. m. I. ſſ.
Flor. Trium Cordial.
Anthos,
Stachados an. m. ſſ.
Sem. Aniſi drach. VI.
Incifa & contuſa coque ſ. a. ex aquæ lib.
VIII. ad medias, colat. Expreſſ. adde
Succi Eryſimi clarific. Unc. VIII.
Sacch. albi lib. III.
Mellis deſpumati lib. I.
F. ſ. a. Syrupus.

Syrupus de Hyſſopo.

℞. *Aquæ Fontanæ lib. VIII.*
Hordei mundati Unc. ſſ.
Coquantur circiter per mediam horam,
ſeinde injiciantur
Rad. Apii,
Petroſelini,
Fœniculi,
Glycyrrhizæ incifar. an. drach. X.
C 2 *Fuju.*

Jujubarum,

Sebesten an. Paria XV.

Passularum mundatarum Unc. I. ss.

Caric ping.

Dactyl. ping. an. N. X.

Semin. Malve,

Cydoniorum,

Gummi Tragacanthi linteoraro inclusorum an. drach. III.

Hyssopi mediocriter siccae drach. X.

Capillorum Veneris drach. VI.

Elixentur simul, sic tamen, ut quadrantis horæ intervallo radices fructus, fructus semina, semina herbas præcedant: tandem quinque libris aquæ desideratis, aut absumptis, adde reliquis tribus colatis prius & clarificatis

Sacchari albiissimi lib. II. ss.

Et percoque in Syrupum, ut artis est.

Syrupus de Mentha.

Rx. Succi Cydonior.

Vini albi an. lib. I. ss.

Menthae siccae lib. ss.

Rosar. rubr. Unc. I. ss.

Nucis Moschatae drach. III.

Cinnamomi Unc. ss.

Mastich. drach. II.

Infund. & diger. ex arena in cucurb. terrea vel vitrea, deinde destill. per alemb. Vitreum aqua Spirituosa ad Unc. X., quæ seorsim asservetur, deindè post alteram ebullitionem colatura Exprim. quæ decantata cum

Sacch.

Sacch. lib. III.

Coq. in Syrup. crassiore, cui demùm
 admisce aquam spirituofam affervatam, &
 folâ diffolutione f. Syrupus.

Syrupus Myrtinus.

℞. *Baccarum Myrti Unc. II. ꝯ.*

Rosarum rubrarum,

Santali albi,

rubri,

Sumach,

Balaustiorum,

Berberorum an. drach. XV.

Mespilorum immaturorum lib. ꝯ.

Coquantur in aquæ fontis lib. VIII. ad
 dimidias, colentur, & cum

Sacchari albissimi lib. III.

Et in fine

Succorum Granatorum,

Cydoniorum depuratorum an. lib. ꝯ.

F. f. a. Syrupus.

Syrupus Papaveris albi.

℞. *Capitum Papaveris albi recentium &
 maturorum lib. I.*

Infunde per diem & noctem in aquæ plu-
 vialis lib. IV. coquantur, donec macref-
 cant & fortiter exprimantur, expreffo adde

Sacchari albissimi,

Penidiorum an. lib. I.

Coque lento igne in Syrupum, cavendo
 unicè ne mucillagineum evadat decoctum,
 quale *Capita Papaveris* etiam præbère so-
 lent, si diù coquantur.

Syrupus Papaveris Erratici.

℞. *Florum Papaveris Erratici lib. ſſ.*

Infunde per noctem in aquæ fontis calentis lib. II. infusio tertio reiteretur, tum adde

Sacch. albissi. cum dicta infus. clarif. lib. I ſſ.

Coquantur in Syrupum s. a. Eodem modo fit Syrupus florum *Chamomillæ*, tum etiam ex partibus albissimis florum *Nymphææ*, repetitis ut dictum est, trinis infusionibus.

Syrupus de Pæonia.

℞. *Rad. Pæoniæ maris Unc. II.*

Nucleorum seminis ejusdem,

Visci quercini veri an. Unc. I.

Herb. Betonicæ.

Primulæ veris,

Verbenæ an. m. I.

Flor. Rosmarini,

Stœchados,

Lavendulæ,

Liliorum convallium,

Tiliæ recentium an. pug. I.

Decoquantur s. a. in aquæ fontis lib. VI. ad dimidias colaturæ fortiter expressæ adde

Sacchari albissimi lib. II.

Fiat, ex arte Syrupus.

Syrupus de quinque Radicibus.

℞. *Rad. Apii,*

Fœniculi,

Petroselini,

Rusci,

*Rufci,**Asparagi an. Unc. II.**Aquæ fontis lib. VI.*Elixando evaporet pars tertia, ex reliquo
cum*Sacchari albissimi lib. III.**Aceti vini albi Unc. VIII.*

Sub finem affusis, conficiatur Syrupus f. a.

Syrupus de Rosis ficcis.℞. *Rosarum rubrarum siccatarum lib. I.*

Infundantur in aquæ calentis puræ lib.

X. horis 24. infusionem hanc (reas-
sumptis semper novis Rosis) triplican-
do : tandem in expressione dilue*Sacchari albissimi lib. IV.*

Coque ex arte in Syrupum.

Syrupus de Scordio.℞. *Rad. Scorzonera recentium Unc. II. ꝯ.**Fol. Scordii recentium m. IV.**Ulmariæ recentium m. II. ꝯ.**Sonchi levis,**Endiviæ,**Borraginis,**Acetosæ,**Scorzonera,**Flor. Nymphaeæ recentium an. m. I.**Cordialium an. pug. I.*Coquantur f. a. in aquæ Hordei integri
lib. VI. ad mediæ partis consumptionem,
colaturæ clarificatæ adde*Sacchari albissimi lib. II.*

Coquantur in Syrupum f. a.

Syrupus de Symphito.

Rx. Rad. & Cymarum Symphiti majoris & minoris an. m. VI.

Fol. Betonica,
Plantaginis,
Pimpinella,
Polygoni,
Scabiosæ,
Tussilaginis,
Rosarum rubrar. recent. an. m. IV.

Contusis omnibus recentibus adde aq. comm. lib. IV. colat. fortiter expressa clarific. cum

Sacchari albißimi lib. IV.

Coquatur in Syrupum.

Syrupus de Stœchade.

Rx. Flor. Stœchados Arabicæ Unc. IV.

Herb. Betonica,
Thymi,
Calaminthæ,
Origani an. Unc. I. ss.
Salvia,

Flor. Rosmar.

Pœoniæ,
Ruthæ,

Cinnamomi,

Zinziberis,

Calami Aromat. an. drach. III.

Macerentur simul in f. q. Hydromel. per 24. horas dein destillationi ut supra commit. ut aqua Spirituosa extrahatur, quâ seorsim exceptâ, reliquæ ulterius coquantur, & cum

BRUXELLENSIS. 41

Sacchari & Mellis optimi an. lib. II.

F. Syrupus crassus ut postea permisceri
queat aquæ spirituosæ.

Syrupus Violaceus.

Rx. *Flor. Violarum à pediculis Herbaceis
mundatorum lib. I.*

Aquæ fontis ferventis lib. II.

Arctè claude in olla nova vitreata per
integrum diem, deindè exprime prælo, in
expressi lib. II. dissolve ad Balnei calorem

Sacchari albissimi lib. IV. & Unc. III.

Spuma emergens auferatur, fiatque sine
Coctione Syrupus s. a.

Nota, si cum Melle quis Syrupum ex
præscripto Medici parare cupiat, is eligat
album odoratissimum, quale Hispanum
est, aut quod Virgineum vocant: rejiciat
verò vulgare illud flatuosum.

Syrupus de Cichoreo cum Rheo.

Rx. *Rhabarb. incisi Unc. I.*

Cinnamomi,

Schænantii an. drach. ss.

Infunde calidè in aquæ Cichorei destill.
Unc. IX. colat. expressa asservetur, tum re-
siduo affund.

Decocti Syrupi de Chicor. compos. lib. I. ss.

Coq. unâ aut alterâ ebullit., colat. Ex-
pressa cum

Sacch. lib. I. clarific.

Percoq. in Syrup. crassior. cui admisce
superiorem Tincturam asservatam, & solâ
dissolut. s. s. a. Syrupus.

Syru-

Syrupus Florum Persicorum.

℞. *Florum Persicorum recentium lib. I.*

Macerentur per 24. horas in aquæ calentis lib. III. expresso postmodum & colato liquori parem florum recentium quantitatem infunde, idque quinies iteretur: postremæ colaturæ accipe lib. III.

Sacchari albissimi lib. II. ꝯ.

F. s. a. Syrupus.

Syrupus de Polypodio.

℞. *Rad. Polypodii quercini recentis lib. I.*

Incidatur, infundaturque horis 24. in lib. IV. aquæ fontis: deindè bulliant ad consumptionem quartæ partis, ac in fine adde

Rad. Acori veri Unc. I.

Sem. Fœniculi drach. III.

Iterum leniter bulliant, ac decocto hujus colato adde.

Infusionis Rosarum solutiæ lib. I. ꝯ.

Succorum depurator. Borriginis,

Fumariæ,

Lupuli an. Unc. VI.

In his Succis & liquoribus coque

Myrobalanorum Citrinorum,

Chebulorum,

Indorum an. Unc. I. ꝯ.

Passularum minorum Unc. III.

Bulliant simul ad consumptionem tertię partis, in fine addendo

Fol. Sennæ Orientalis mundator. Unc. VI.

Sem Fœniculi dulcis Unc. I.

Infun-

Infunde per noctem, postmodum exprimantur, & colentur, ac colatura cum
Sacchari lib. III.

Coquatur in Syrupum, usui reponendum.

Syrupus de Rhamno Cathartico.

℞. *Baccarum, fruticis spinæ Cervinæ in principio Octobris collectarum quantitatem sufficientem.*

Contundantur in pilâ lapideâ, deinde exprimendo colentur: succus expressus coquatur lento igne ad quartæ partis consumptionem, tum iterum coletur.

℞. *Hujus Colati lib. II.*

Sacchari albissimi Unc. XVI.

Coquantur simul in Syrupi consistentiam, cui tandem admisce elæosaccharum.

Sacch. pulveris Unc. ℥.

Ol. Stillat. Anisi,

Caryophyll.

Nucis Moschatæ,

Cinnamomi an. gutt. VI.

Misce f. Syrupus.

Syrupus Regis solutivus.

℥. *Fol. Sennæ mundatorum Unc. II.*

Aquæ Fœniculi lib. II.

Infunde per 24. horas, tum adde

Infusionis violarum ex quinque infusionib.

Infus. Rosar. ex novem infus. an. Unc. VIII.

Sacchari albissimi lib. II.

Misce, f. f. a. Syrupus.

Syrupus Rosarum solutivus.

℞. *Rosarum pallidarum recentium, ut decet, mundatarum lib. III.*

Aquæ fontis lib. XII.

Infundantur per diem naturalem, deinde rursus calefactæ exprimantur, iterum in eadem aqua par florum quantitas infundatur & exprimatur, & hoc nonies, ut antè dictum est, reiteretur: tum

℞. *Colaturæ præscriptæ partes sex.*

Sacchari albissimi partes quatuor.

Clarificentur, & coquantur in Syrupum.

D E M E L L I T I S.

Mellis despumatio.

℞. *Mellis optimi lib. IV.*

Aquæ fontis lib. II.

Coque s. a. semper despumando ad aquæ consumptionem.

Hydromel simplex.

℞. *Mellis optimi lib. I.*

Aquæ fontis lib. VIII.

Decoquantur simul benè despumando, dum ovum recens impositum supernatare queat.

Oxymel simplex.

℞. *Mellis optimi lib. IV.*

Aquæ fontis lib. I.

Coquantur simul in vase fictili, semper despumando ad aquæ consumptionem, tum adde

Aceti acerrimi lib. II.

Coque s. a. donec Syrupi liquidioris
consistentiam acquirat.

Oxymel Scylliticum.

℞. *Mellis despumati ad consist. cocti lib. III.*
Aceti Scyllitici lib. II.

Misce sine ullâ coctione ad usum.

Oxymel Marrubiatum.

℞. *Decocti Marrub. albi.*
Mellis despum. an. lib. I.

Coque in Syrup. crassior. adde
Aceti vini optimi lib. ℥.

Mel Mercuriale.

℞. *Succi herbae Mercurialis foeminae s. a.*
depurati lib. VI.
Mellis depurati lib. IV.

Coque s. a. in Syrupi consistentiam.

Mel Rosarum.

℞. *Rosarum rubrarum recentium lib. III.*
Aquæ fontis calentis lib. XII.

Infundantur simul per 24. horas, &
exprimantur, eadem infusio tertio itere-
tur, deindè infusio expressa cum

Mellis depurati lib. X.

Coquatur in Syrupi consistentiam.

Diamorum.

℞. *Succi Mororum Batinorum. i. Rubi hu-*
milis immaturorum lib. I. ℥.

Succi Mororum Celsi domesticor. ex ar-
bore pendentium non maturor. Unc. IX.

Coque

Coque lento igne in vase terreo vitreato
ad tertiæ partis consumptionem, & post
depurationem adde

Mellis optimi depurati lib. I. ꝯ.

Sapæ Unc. III.

Coque leniter ad Syrupi consistentiam.

LOOCH SEU LINCTUS.

Looch sanum & expertum.

℞. Passularum exacinatorum,

Caricarum pinguium,

Dactylorum an. Unc. II.

Zizifa,

Sebesten an. Num. XXX.

Radicum Ireos Florentina,

Glycyrrhizæ,

Flor. Hyssopi,

Calaminthæ,

Polytrici,

Sem. Anisi,

Fœniculi,

Lini,

Cinnamomi an. Unc. ꝯ.

Decoquantur omnia s. a. in aquæ lib.
V. ad remanentiam librarum duarum: ex-
pressioni adde

Penidiorum lib. II.

Et rursus coquantur ad Mellis consi-
stentiam, tumque adjice minutim con-
tusas

Pinearum purgatarum drach. V.

Amygdalarum dulcium mund. drach. III.

Qui-

Quibus ritè commixtis insperge pulve-
res sequentium

Rad. Glycyrrhizæ rasæ,

Gummi Arabici,


Tragacanthi,

Amyli an. drach. III.

Rad. Ireos Florentinæ drach. II.

Agitentur omnia simul, donec albes-
cant, & linctus formam nanciscantur.





CLASSIS QUARTA.

*De Rob , Conditis , Conservis
& Tragematis.*

Parantur hæc eodem modo.

*Rob. Berberorum ,
Cerasorum nigror.
rubror.*

Ribesiorum &c.

Rx. *Succi cujusvis recenter expressi lib. II.
Sacchari albissimi depurati lib. I.*

Coquantur lento igne in vase fictili donec
Gelatinæ consistentiam acquirant.

Rob Cydoniorum.

Rx. *Succi Cydoniorum depurati lib. XII.*

Coque in vase fictili lento igne ad remanentiam lib IV. tum adde

Sacchari albissimi depurati lib. IV.

Et repetitâ cocturâ , f. Rob f. a.

Rob Sambuci.

Rx. *Succi Baccar. Sambuci maturarum q. v.*

Inspissetur sensim in vase fictili igne lento , addendo pro quaque librâ succi

Sacchari Unc. III.

Eodem modo paratur *Rob Ebulinum, Juniperi , & Veronicae* , nisi quod in hoc postremo sacchari & succi tantumdem expetatur.

CON-

CONDITA.

Radicum, Caulium, Corticum,
Florum, Fructuum, Pulparum.

℞. *Radicum Eryngii q. v.*

Mundentur exterius, coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad mollitiem Radicum, in decocto dissolve

Sacchari albissimi pondus æquale.

Et coque ad consistentiam Syrupi crassioris, auferendo spumam, & postquam refrixerit adde Radices, & post aliquot dies decantetur Syrupus, & recoquatur ad debitam Syrupi consistentiam, & Radicibus adde dum adhuc calet; & si superflua sit humiditas etiam tertio Syrupus recoquendus est.

His non multum dissimiliter condiuntur.

Radices	{	<i>Acori vulgaris,</i>
		<i>Angelica,</i>
		<i>Borraginis,</i>
		<i>Buglossi,</i>
		<i>Cichorei,</i>
		<i>Enulae Campanæ,</i>
		<i>Pimpinellæ,</i>
		<i>Satyrii,</i>
		<i>Sisari,</i>
		<i>Symphyti majoris,</i>
		<i>Scorsoneræ, &c.</i>

℞. *Corticum Aurantium recentium q. v.*

Tenuiter aufer interiorem partem albicantem, & in aqua fontana macera, & coque donec leniter mollescant, tum procedatur

D

datur

50 P H A R M A C O P O E A
datur ut de *Radicibus Eryngii* dictum est.
Pari modo parantur :

Cortices | *Citriorum,*
Limonum, &c.

CONSERVÆ & SACCHARATA

Herbarum Absinthii utriusque,
Acetosellæ,
Florum Aurantiorum,
Calendulæ,
Borraginis,
Violarum,
Salviæ,
Rosarum rubrarum,
Damascenarum,
Rosmarini, &c.

Ex his omnibus fiunt Conservæ cum
Sacchari albißimi tripla proportionem; no-
tandum tamen, quod humidioribus singulis
libris Sacchari libræ duæ sufficiant.

T R A G E M A T A.

Tabellæ Aromatici Rosati.

℞. *Specierum Aromatici Rosati* drach. II.
Sacch. albiss. aqua Rosar. soluti Unc. IV.
Misce f. f. a. Tabellæ.

Tabellæ Diacodii.

℞. *Seminum Papaveris albi* Unc. I.
Extrahatur f. a. Emulsio cum
Aquarum Rosarum,
Scabiosæ an. Unc. I. ss. cui adde
Sacchari albi conglobati Unc. IV.
Coque

BRUXELLENSIS. 51

Coque s. a. continuò movendo ad consistentiam Tabellarum.

Saccharum perlatum.

R. Sacchari albissimi lib. I.

Aquæ Rosarum q. s.

Coquantur in consist. Tabell. sub finem
Coctionis immiscendo

Margarit. præp. & trit. Unc. ss.

F. f. a. Tabellæ.



CLASSIS QUINTA

De Electuariis Solutivis.

Benedictum Laxativum.

℞. **T**Urpethi drach. X.
Radicum Esulæ minoris præparat,
Hermodactylorum,

Diagrydii,
Rosarum rubrarum an. drach. V.

Zinziberis,

Galangæ,

Garyophyllorum,

Cardamomi,

Amomi, vel ejus defectu Acori.

Piperis longi,

Macis,

Spicæ Nardi,

Croci Orientalis,

Sem. Apii,

Carui,

Fœniculi,

Saxifragiæ,

Milii Solis,

Asparagorum,

Rusci,

Salis Gemmei pulverisator. an. drach. I.

Mellis despumati lib. I. ss.

Fiat Electuarium lege artis. Possunt
 etiam species per se in officinis commodè
 reservari.

Caryocostinum.

℞. *Garyophyllorum*,
Costi odorati,
Zinziberis,
Cinnamomi an. drach. II.
Hermodactylorum,
Diagrydii an. Unc. ss.

Misce, fiat omnium pulvis, & cum triplo Mellis ex Vino albo despumati & cocti f. f. a. Electuarium.

Cholagogum.

℞. *Pulp. Prunor. acido dulc. Unc. X.*
Cremor Tartari,
Scamm. optimi an. Unc. II.
Rhabarb. Electi drach. X.
Cinnamomi acuti Unc. ss.
Santali citrini drach. II.
Sacchari clarificati Unc. XVI.
 Misce f. f. a. Electuarium.

Dia-Catholicon.

℞. *Rad. Polypodii quercini recent. Unc. IV.*
Sem. Foeniculi Unc. I.
Aquæ fontis lib. IV.

Bulliant ad dimidias; colato adde
Sacchari albi Farinacei lib. II.

Coquantur in Syrupum, quo dissolve
Pulparum Cassiæ,
Tamarindorum an. Unc. II.

Dissolutis adde sequentia pulverisata.

Fol. Sennæ mundatorum Unc. II.
Rhabarbari electi,

Mechoacannæ an. Unc. I.

Florum Violarum siccarum,

Seminum Anisi an. Unc. ss.

Glycyrrhizæ,

*Seminum quatuor frigidorum majorum
enucleatorum an. drach. II.*

Misce f. s. a. Electuarium.

Dia-Phœnicum.

℞ *Pulpæ Palmular. in hydromelite macerat.
coctæ, & per setaceum transmissæ.*

Penidiorum recentium an. lib. ss.

Amygdalar. dulcium expurg. Unc. III. ss.

Contusis & permixtis omnibus, adde

Mellis despumati lib. II.

Coquantur paulum, deinde insperge
sequentes pulveres.

℞. *Zinziberis,*

Piperis longi,

Maceris,

Cinnamomi,

Fol. Ruthæ siccorum,

Sem. Dauci,

Fœniculi an. drach. II.

Turpethi Unc. IV.

Diagrydii Unc. I. ss.

Misce, f. a. Electuarium.

Hydragogum.

℞. *Baccar. Juniper. in aqua coct. Express.
& ad Pulpæ consistent. redact.*

Pulpæ Tamarindorum an. Unc. IV.

Rad. Jalappæ Unc. ss.

Scam-

Scammonii Electi Unc. I.

Cinnam. acuti,

Sem. Foeniculi dulcis an. drach. II.

Sacchari clarificati Unc. X.

Misce f. f. a. Electuarium.

Electuar. de sicco Rosarum.

Rx. Succi Rosarum pallidarum depurati,

Sacchari albi conglobati an. lib. I ss.

Coctis f. a. insperge sequentes pulveres :

Scammonii præparati Unc. I. ss.

Santalorum omnium.

Cinnamomi an. drach. II.

Camphoræ scrup. I.

Misce f. f. a. Electuarium.

Hyera Pycra.

Rx. Cinnamomi,

Maceris,

Azari,

Spicæ Indicæ,

Croci,

Mastiches pulverisatorum an. drach. VI.

Aloës non lotæ pulverisatæ Unc. XII. ss.

Mellis optimi depurati lib. IV. Unc. III.

Species melli despumato non sunt injiciendæ, nisi id ipsum ab igne fuerit remotum, ac ferè refrigeratum; alioquin Aloë rursus conglobatur, & picis instar indurata coit. Species etiam seorsim servantur in Officinis.

Confectio Hamech.

℞. *Fol. Sennæ mundat.**Rad. Polypodii quercini,**Rhabarb. Electi.**Agarici albi &**Pulpæ Colocynthis in nodulo ligator.**Florum Violarum,**Herb. Epithymi an. Unc. II.**Absynthii vulgaris,**Thymi an. Unc. I.**Sem. Anisi,**Fœniculi,**Rosar. rubrar. an. Unc. ꝯ.*

Infunde & coque in f. q. feri lactis, colaturæ expressæ adde

*Succi fumaricæ depurati,**Sacchari an. lib. I. ꝯ.*

Decoctis ad mellis consistentiam & percolatis adde

*Pulpæ Cassiæ,**Prunorum,**Tamarindorum,**Mannæ calabrinæ an. Unc. I. ꝯ.*

In debitam consistentiam reductis insperge

*Folior. Sennæ mundat.**Rhabarb. Electi an. Unc. I.**Scammonii præparati Unc. I. ꝯ.**Semin. Fumaricæ,**Anisi,**Spicæ Nardi Indicæ an. drach. II.*

F. f. a. Electuarium.

Passu-

Passulæ Corinthiacæ Laxativæ.

Rx. Passularum Corinthiacarum mundatarum Unc. IV.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad mollitiem, & in Unc. VIII. prædicti decocti, & Vini albi Unc. II. infunde per 24. horas

Fol. Sennæ mundatorum drach. VI.


Cremoris Tartari pulverisati drach. II.

Seminis Anisi drach. I.

Posteà colentur, & colaturæ adde passulas jam coctas cum *Mannæ & Sacchari albi ana Unc. II.* & post unam alteramve ebullitionem repone.

Eodem modo parantur *Pruna Damascena* Officinis usitata.





CLASSIS SEXTA.

*Species Aromaticas & Pulve-
res continens.*

Species Aromatici Rosati.

℞. *R*osar. rubrar. exungulatarum dr. XV.
Glycyrrhizæ rasæ drach. VII.

Ligni Aloës,

Santali Citrini an. drach. III.

Cinnamomi electi drach. V.

Macis,

Garyophyllorum an. drach. II. ꝯ.

Gummi Arabici,

Tragacanthi an. scrup. VIII.

Nucis Moschatæ,

Cardamomi minoris,

Galangæ an. drach. I.

Spicæ Nardi scrup. II.

Misce f. f. a. Pulvis.

Nota, quod omnes Pulveres servandi
sint in Vase vitreo, vel fictili vitreato ad
usum.

Species Dia-Margariti frigidi.

℞. *Margaritarum præparatarum* drach. III.

Radicum Contrayervæ,

Cinnamomi optimi,

Trium-santalorum,

Ligni Aloës,

Zedo-

Zedoariæ,
 Baccarum Myrti,
 Rasuræ Eboris,
 Typhorum cornu Cervorum spagyricè
 præparatorum,
 Sem. Portulacæ,
 Endiviæ,
 Oxalidis,
 Citri an. drach. I.
 Coralli utriusque præparati an. drach. ꝯ.
 Flor. Buglossæ,
 Rosarum rubrarum,
 Violarum,
 Nymphææ an. drach. I.
 Misce f. f. a. Pulvis.

Species Diambæræ.

R. Cinnamomi optimi,
 Rad. Zedoariæ,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Nucis Moschatæ,
 Folij Indici an. drach. III.
 Spicæ Indicæ,
 Cardamomi majoris,
 minoris an. drach. I.
 Zinziberis drach. I. ꝯ.
 Ligni Aloës,
 Santali Citrini,
 Piperis longi an. drach. II.
 Ambre griseæ drach. I. ꝯ.
 Misce f. f. a. Pulvis.

Species Dianthos.

℞. *Florum Rosmarini Unc. I.**Rosarum rubrarum exungulatarum ,*
*Violarum ,**Glycyrrhizæ rasæ an. drach. VI.**Garyophyllorum ,**Spicæ ,**Nucis Moschatae ,**Galangæ ,**Cinnamomi optimi ,**Zinziberis ,**Zedoariæ ,**Macis ,**Ligni Aloës ,**Cardamomi minoris ,**Seminum Anisi ,**Anethi an scrup. IV.*

Misce, & f. s. a. Pulvis.

Species Diarrhodonis.

℞. *Rosarum rubrar. exungulatarum dr. XI.**Santali albi ,**rubri an. drach. II.**Ligni Aloës ,**Tragacanthi ,**Eboris usti an. scrup. II.**Macis ,**Spicæ Nardi ,**Rhabarbari optimi ,**Cinnamomi ,**Garyophyllorum ,**Croci ,**Radicum Asari ,*

BRUXELLENSIS. 61

Fructuum Berberorum exsiccatorum ,

Sem. Anisi ,

Cardamomi ,

Foeniculi ,

Ocymi ,

Papaveris albi ,

Quatuor frigidorum minor. mundat.

Scariolæ ,

Succi Glycyrrhizæ ,

Mastiches an. scrup. I.

Rasuræ cornu Cervi ,

Margaritarum præparatarum an. scrup. I

Camphoræ grana VII.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Species Dia-tragacanthi frigidi.

℞. *Gummi Tragacanthi albi Unc. ss.*

Arabici drach. II. ss.

Amyli drach. I.

Glycyrrhizæ ,

Nucleorum sem. Citrulli ,

Cucumeris ,

Cucurbitæ ,

Melonum an. drach. ss.

Sem. Papaveris albi scrup. II. & grana V.

Sacchari candi drach. VI.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Species Lætificantis.

℞. *Melissæ ,*

Corticum Citri extimorum exsiccator. ,

Garyophyllorum ,

Mastiches ,

Croci ,

Cinna-

Cinnamomi ,
 Nucis Moschatae ,
 Cardamomi majoris ,
 Nucleorum seminum Pæoniæ ,
 Been albi ,
 rubri ,

Zedoariae ,
 Doronici veri ,
 Sem. Ocymi Garyophyllati an. Unc. ss.
 Ligni Aloës ,
 Ossis de corde Cervi ,
 Margaritarum præparatarum an. drach. ss.
 Rasuræ Eboris drach. I.

Misce , f. f. a. Pulvis.

Species Dia-Curcumæ.

℞. Croci ,
 Asari ,
 Sem. Petroselini Macedonici ,
 Dauci ,
 Anisi ,
 Apii an. Unc. ss.
 Rhabarbari ,
 Rad. Angelicæ ,
 Valerianæ majoris ,
 Spicæ Indicæ an. drach. VI.
 Scolopendrii seu Ceterach. drach. II. ss.
 Costi ,
 Myrrhæ ,
 Cassiæ Lignæ ,
 Shænanthi ,
 Cubebarum ,
 Rubiæ ,
 Succii Absinthij ,

Eupa-

Eupator.

Olei Garyophyllorum an. drach. II.

Calami Aromatici ,

Cinnamomi an. drach. I. ꝯ.

Scordij veri ,

Succi Glycyrrhizæ an. drach. II. ꝯ.

Tragacanthi drach. I.

Misce f. f. a. Pulvis.

Species Dia-Galangæ.

℞. Rad. Galangæ drach. VI.

Ligni Aloës ,

Sem. Cumini ,

Levistici ,

Rad. Acori ,

Zinziberis ,

Piperis albi ,

longi ,

Garyophyllorum ,

Cinnamomi ,

Macis an. drach. I. ꝯ.

Folior. Calaminthæ ,

Menthæ siccæ.

Spicæ Nardi Indicæ ,

Sem. Apii ,

Anisi ,

Cardam. min.

Carui ,

Feniculi an. drach. I.

Misce f. f. a. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus Magistralis.

℞. Bezoar. mineral. Unc. II.

Terræ Sigillatæ ,

Coral-

64 P H A R M A C O P O E A

Corallorum præpar. an. Unc. I.

Cinnabar. nativi,

Coccinellæ an. Unc. ꝯ.

Camphoræ drach. II.

Misce f. Pulvis.

Pulvis è Chelis Cancrorum.

℞. Margarit. Orient. præparat.

Oculor. Cancr.

Corallor. rubr.

Succini albi,

Bezoard. Occident.

Pulv. Viperar.

Cornu Cervi spagyr. præpar. an. dr. VI.

Contra-yervæ,

Serpentariæ Virgin. an. Unc. ꝯ.

Chelorum Cancror. ad pondus omnium.

Misce f. Pulvis.

Pulvis Cachecticus.

℞. Limaturæ Chalybis subtilis. pulver. Unc. I.

Rad. Aronis drach. I. ꝯ.

Ocul. Cancr.

Cornu cervi spagyr. præpar.

Succini,

Cinnamomi acuti an. scrup. II.

Misce f. Pulvis.

Pulvis ad Casum.

℞. Sanguinis Draconis optimi drach. II.

Sanguinis Hirci optimè præparati,

Oculorum Cancrorum præparatorum,

Boli Armeni optimi an. drach. III.

Myrrhæ rubræ,

Radicum Rubiæ tinctorum an. drach. II.

Nucis

BRUXELLENSIS. 65

Nucis Moschatæ drach. I. ꝯ.

Rhabarbari optimi,

Spermatis Ceti recentioris an. drach. I.

Misce, & fiat Pulvis subtilissimus.

Pulvis Liberans.

R. *Boli Armeni debite præparati Unc. I. ꝯ.*

Terræ Lemniæ Orientalis Unc. I.

Corallorum albor. præparator. drach. III.

rubror. præparat. drach. II.

Lapidum pretiosorum, Smaragdi, Rubini, Hyacinthi an. drach. II.

Margaritarum præparatar. drach. II. ꝯ.

Cinnamomi drach. I.

Garyophyllorum drach. ꝯ.

Seminis Acetosæ drach. I.

Corticum Citri,

Santali rubri,

albi an. drach. ꝯ. grana XV.

Spodii drach. II. ꝯ.

Rasuræ Eboris drach. I. ꝯ.

Croci Orientalis drach. ꝯ.

Misce, & f. omnium pulvis, cui admisce

Folia Auri bracteati Num. XX.

Pulvis contrà Abortum.

R. *Rasuræ Eboris,*

Granorum Chermes an. drach. I.

Santali rubri drach. ꝯ.

Garyophyllorum scrup. I.

Nucis Moschatæ scrup. II.

Radicum Tormentillæ drach. ꝯ.

Margaritarum præparatarum,

Coralli utriusque præparator. an. scrup. I.

E

Folia

*Folia Auri Num. III.**Sacchari tabulati perlati drach. III.**Misce, & f. f. a. Pulvis.***Pulvis de Gutteta.***℞. Rad. Pæoniæ maris Lunâ decrefcente
collectarum,**Seminum ejusdem,**Dictamni albi,**Visci quercini veri an. Unc. ꝯ.**Seminum Atriplicis drach. II.**Cranii humani crudi pulveris. drach. III.**Corallorum rubrorum præparatorum,**Hyacinthorum præparator. an. drac. I. ꝯ.**Ungulæ Alcis præparatæ Unc. ꝯ.**Foliorum Auri drach. I.**Misce, & f. f. a. Pulvis.***Pulvis Haly.***℞. Sem. Papav. albi drach. I. & grana XV.**Gummi Arabici,**Tragacanthi,**Spodii ex Ebore,**Amyli,**Glycyrrhizæ an. scrup. I. & grana II.**Sem. Portulacæ,**Malvæ,**Althææ mund. an. dr. ꝯ. & gr. VII.**Sem. quatuor frigidorum maj. excorticat.**Cydoniorum excorticatarum an. scr.**II. & grana XII.**Sacchari candi albi ad pondus omnium.**Misce, & f. f. a. Pulvis.**Nota, quod hic Pulvis semper recens
parari debeat.*

Pulvis Hæmophthoicus.

℞. *Capitis mortui Vitrioli post spiritus & olei extractionem relictæ & subtilissimè pulverisati lib. I.*

Infunde per horas 24. in aquæ ferventis lib. VI. postea decanta aquam per inclinationem, & novam aquam semper singulis 24. horis affunde, & vigesies hunc laborem repete, donec Pulvis omni acrimoniâ & austeritate privatus sit, insipidusque evadat.

Aquas infusionum ne abjicias, sed ad usum Medicum serva in Vase vitreo.

Pulvis Pleuriticus.

℞. *Rasuræ minutissimæ dentium crudorum Apri Unc. ss.*

Flor. Papaveris Rhæados drach. I. ss.

Priapi Cervi drach. III.

Oculorum Cancrorum præp. drac. II.

Radicum Bardanæ,

Sanguinis Hirci præparati an. Unc. ss.

Croci drach. I.

Misce, & fiat Pulvis tenuissimus.

Pulvis Reginæ.

℞. *Rad. Curcumæ Unc. I.*

Sem. Saxifragiæ,

Milij Solis an. drach. III.

Sem. Anisi,

Apii,

E 2

Carui,

*Carui,**Cumini,**Fœniculi,**Petroselini,**Rutæ an. drach. II.**Glycyrrhizæ rasæ drach. III.**Granorum Juniperi,**Baccarum Lauri,**Nucis Moschatae,**Galangæ,**Sanguinis Hircini præparati,**Cinnamomi acuti an. drach. II.**Croci scrup. I.*

Misce, & fiat omnium Pulvis, cui præ
arbitrio Medici additur Saccharum.

Pulvis Stomachicus.

℞. Rad. Ari præparatarum Unc. II.

*Pimpinellæ Saxifragæ,**Acori vulgaris an. Unc. I.**Oculorum Cancrorum præparatorum,**Cinnamomi acuti an. drach. III.**Salis Absynthii,**Juniperi an. drach. I.*

Misce f. Pulvis.

Pulvis contrà Vermes.

℞. Cornu Cervi usti Unc. II.

*Seminum Zedoariæ Unc. I.**Caulium,**Portulacæ,**Corallinæ an. Unc. ss.*

Misce, & fiat Pulvis.

CLASSIS SEPTIMA.

Continens Pulveres solutivos.

Pulvis Catholicus.

- ℞. **D** *Iagrydii drach. IX.*
Antimonii per trinam detonationem cum tertia parte nitri parati & non edulcorati drac. VI.
Tartari Crystallini drach. III.
 Misce f. Pulvis.

Pulvis Dia-Carthami.

- ℞. *Medullæ Seminis Carthami,*
Hermodactylorum mundatorum,
Specier. Dia-traganthifrigidi an. Unc. ff.
Turbith optimi drach. VI.
Diagrydii drach. III.
Zinziberis,
Cinnamomi an. drach. II.
 Misce, & f. f. a. Pulvis.

Nota, quod Diagrydium semper sit per se terendum, postea aliis immiscendum.

Pulvis Dia-Turbith cum Rheo.

- ℞. *Rhabarbari optimi drach. X.*
Turbith albi & gummosi,
Hermodactylorum mundator. an. Unc. I.
Diagrydii Unc. ff.
Zinziberis,

Santali albi,
rubri,

Florum Violarum an. drach. I. ꝯ.

Mastiches,

Semin. Anisi,

Cinnamom.

Croci an. drach. ꝯ.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis Hermodactylatæ Venetæ.

℞. *Hermodactylorum à Cortice superiorum mundatorum Unc. I. ꝯ.*

Turbith alb. & gummosi Unc. I.

Glycyrrhizæ rasæ,

Mechoacæ albæ an. drach. VI.

Diagrydii drach. III.

Zinziberis drach. II.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis Sennæ Montagnanæ.

℞. *Fol. Senæ Oriental. mundator. Unc. II.*

Cremoris Tartari Unc. ꝯ.

Semin. Fœniculi dulcis drach. II.

Salis gemmæ,

Macis,

Cinnamomi an. drach. I.

Misce, & fiat Pulvis.

Pulvis pro Suppositoriis.

℞. *Aloës drach. II.*

Cumini,


Rutæ,

Salis gemmæ an. drach. I.

Misce & f. Pulvis qui cum f. q. mellis cocti subigatur & f. Supposit.

Si fortiora desiderentur potest addi

Trochis. albandal. drach. I.



CLASSIS OCTAVA.

De Antidotis, & Opiatis.

Confectio Alkermes.

℞. *Syrupigranorum Kermes Montepessulo*
delati lib. II. ss.

Calefacto adde

Ambræ griseæ minutim incise drach. II.

Liquefactâ Ambrâ insperge sequentes
Pulveres.

Ligni Aloës,

Cinnamomi an. drach. VI.

Lapid. Lazuli præpar.

Margarit. Orient. an. drach. II.

Fol. Auri N. XX.

Misce f. Electuarium.

Diascordium Fracastorii.

℞. *Fol. Scordii ficcator.*

Rosar. rubrar. an. Unc. I.

Boli Armeni veri Unc. II.

Rad. Bistortæ,

Gentianæ,

Tormentille,

Cassie lignæ,

Cinnamomi,

Dictamni Cretici,

Sem. Acetosæ,

Styracis calamitæ,

E 4

Gal-

Galbani,
 Gummi Arabici an. Unc. ꝯ.
 Opii Thebaici præpar.
 Zinziberis,
 Piperis longi an. drach. II.
 Mellis despumati lib. III.
 Vini generosi Canarini q. s.
 F. f. a. Opiatum.

Confectio Hyacinthorum.

℞. Hyacinthorum,
 Coralli rubri,
 Boli Armeni,
 Terræ Lemniæ an. Unc. ꝯ.
 Granorum Kermes,
 Rad. Tormentillæ,
 Dictamni,
 Sem. Acetosæ,
 Limonum,
 Portulacæ,
 Flor. Rosarum rubr.
 Croci, ꝯ.
 Santalor. omnium,
 Rasuræ Eboris an. scrup. IV.
 Cornu cervi drach. III.
 Sapphyri,
 Smaragdi,
 Topasii,
 Margaritarum,
 Fol. Auri,
 Argenti an. scrup. II.
 Syrupi de Cortice citri q. s.
 Misce f. f. a. Electuarium.

Mithridatium Damocratis.

℞. *Radicum Zinziberis*,
Spicæ Nardi mundatæ,
Cinnamomi,
Croci Britannici,
Agarici albi & levis,
Myrrhæ electæ,
Thuris masculi,
Sem. Thlaspios an. drach. X.
Seseleas Massiliensis,
Costi odorati,
Fol. Malobatri, ejus loco, *Corticum*
exteriorum Citri,
Schoenanthi,
Stoechados Arabicæ,
Piperis longi,
Succi Hypocistidos,
Galbani in guttis,
Opoponacis in guttis,
Styracis Calamitæ in guttis,
Therebintinæ Cypriæ,
Opobalsami, ejus loco, *Olei Nucis Mo-*
schatæ per expressionem facti,
Castorei an. Unc. I.
Cassie lignæ,
Foliorum Polij montani albi,
Scordii veri,
Piperis albi,
Carpobalsami, ejus loco, *Gran. Junip.*
Seminis Dauci Cretici,
Bdellij,
Trochiscorum Cypheos an. drach. VII.
Nardi Celticæ purgatæ,
Radicum

Radicum Gentianæ,
Dictamni Cretici,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Gummi Arabici vermiculati,
Opii Thebaici nitidi præparati,
Sem. Cardamomi minoris,
Foeniculi,
Petroselini Macedon. an. drach. V.
Rad. Acori,
Asari,
Valerianæ majoris,
Sem. Anisi,
Sagapeni an. drach. III.
Rad. Men Athamantici,
Sem. Hyperici,
Acaciæ,
Lumborum Scinci an. drach. II. ꝯ.
Mellis despumati optimi & debite cocti
lib. IX. Unc. VIII. & drach. II.

Dissolvantur Succī & Gummi (præter
 Arabicum & Thus, quæ teri debent) vino
 Malvatico, & f. s. a. Electuarium.

Philonium Romanum.

℞. *Piperis albi,*
Cassie lignæ,
Cinnamomi an. drach. II.
Euphorbij,
Pyretri an. drach. ꝯ.
Zedoariæ,
Spicæ Nardi an. scrup. II.
Sem. Hyosciami albi Unc. ꝯ.
Opii præparati drach. II. ꝯ.
Croci drach. ꝯ.

Castorei,
Myrrhæ an. drach. I. ss.

Sem. Apij,
Fœniculi,
Dauci,
Petroselini an. drach. I.

Mellis optimi despumati lib. I.

Dissolvatur *Opium* cum modico vini,
 cui admisceantur *Crocus*, & *Euphorbium*
 subtilissimè pulverisata, & addito melle
 inspergantur Pulveres, & misceantur,
 fiatque s. a. Electuarium Opiatum.

Requies Nicolai.

Rx. Flor. Rosarum rubrar. exungulatarum
Violarum an. drach. III.

Opij præparati,
Sem. Papaveris albi,
Hyosciami albi,
Scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Psyllii,

Corticum Radicum Mandragoræ,
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi an. drach. I. ss.
Santali albi,
citrini,
rubri,

Spodij,
Tragacanthæ an. scrup. II. & grana V.
Mellis despumati optimi & cocti triplum.
 Misce, & fiat Electuarium Opiatum.

The-

Theriaca Andromachi senioris.

℞. Trochiscorum Scylliticorum Unc. VI.

De Viperis,

Magmae Hedycroi,

Piperis longi,

Opij Thebaici præparati an. Unc. III.

Radici Ireos Florentinae,

Agarici albi & levis,

Comarum Scordij veri,

Rosarum rubrarum exungulatarum,

Cinnamomi,

Opobalsami, ejus loco, Olei Nucis Moschatae,

Succi Glycyrrhizæ,

Sem. Napi agrestis an. Unc. I. ff.

Rad. Costi odorati,

Quinquefolij,

Rhapontici, vel si desit, Rhabarb.

Spicæ Nardi Indicæ,

Zinziberis,

Cassiae lignæ,

Fol. Dictamni Cretici,

Calaminthæ montanae,

Prassii albi,

Schoenanthi,

Stœchados Arabicæ,

Croci Britannici,

Piperis albi,

nigri,

Sem. Petroselini Macedonici,

Therebinthinæ Cypriæ,

Thuris masculi,

Myrrhæ an. drach. VI.

Rad.

Rad. Gentianæ,
Meu Athamantici,
Valerianæ majoris,
Nardi Celticæ,
Foliorum Malobatri, ejus loco, Corti-
cum limonis siccatorum,
Polij montani albi,
Comarum Chamœdrios,
Chamœpiteos,
Hyperici,
Carpobalsami, ejus loco, Baccar. Junip.
Amomi, ejus loco, Acori veri,
Sem. Anisi,
Ammios,
Cardamomi minoris,
Foeniculi,
Seseleos Massiliensis,
Thlaspios,
Terræ sigillatæ Orientalis,
Chalcitidis præp. ad color. cineritium usq.
Succi Acaciæ condensati,
Hypocistidis,
Styracis Calamitæ in guttis,
Gummi Arabici vermiculati,
Sagapeni an. Unc. ss.
Radicum Aristolochiæ tenuis,
Summitatum Centaurii minoris,
Sem. Dauci cretici, illius loco, Nostratis,
Galbani in guttis,
Opoponacis in guttis,
Bituminis Judaici,
Castorei an. drach. II.
Mellis optimi despumati & ad consisten-
tiam cocti lib. XIV. Unc. V. & dr. II.
 dissol-


78 PHARMACOPŒA
Diffolvantur Succī & Gummi Vīno
Malvatico, fiatque f. a. Electuarium.

Theriaca Dia-Teffaron.

℞. Rad. *Gentianæ*,
 Aristolochiæ rotundæ,
Baccarum *Lauri excorticatarum*,
Myrrhæ an. Unc. I.
Mellis despumati lib. I.
Misce, & f. f. a. Electuarium.

Electuarium è Succo Ruthæ.

℞. Rad. *Aristolochiæ longæ veræ*,
 Rotundæ,
 Rubiæ tinctorum,
Baccarum *Lauri excorticatarum*,
Granorum *Juniperi*,
Sem. Dauci,
 Agni casti,
 Rutæ,
Sabinæ an. drach. I.
Croci,
Lapidis Gagatis,
Myrrhæ,
Castorei an. scrup. I.
Nucleorum seminum Pœoniæ scrup. II.
Dictamni cretici drach. ꝯ.
Fiat omnium Pulvis, & cum
Sacchari albi succo Rutæ dissoluti Unc. III.
Fiat lege artis Electuarium.



CLASSIS NONA.

*De Pilulis , Extractis , &
Essentiis.*

Pilulæ Aloëphanginæ.

℞. **C** *Innamomi ,
Garyophyllorum ,
Cardamomi minoris ,
Nucis Moschatæ ,
Macis ,
Calami aromatici ,
Carpobalsami ejus loco, Baccar. Junip.
Schoenanthi ,
Ligni Aloës ,
Santali citrini ,
Rosarum rubrarum exungalatarum ,
Absinthij ficcati an. Unc. ss.*

Ex his crassiusculè tritis educatur per
spiritum vini tinctura in vase vitreo probè
clauso : in *Colaturæ lib. III.* nutriatur.

Aloës purissimæ lib. I.

Cui dissolutæ adde

Mastiches ,

Myrrhæ pulverisatarum an. Unc. ss.

Croci drach. II.

Balsami Peruviani drach. I.

Tandem absumptâ humiditate superfluâ,
super cineres calidos , aut in Hypocausto
redigantur in *Massam Pilularum.*

Pilulæ

Pilulæ Cochiae.

℞. *Specierum Hyera simplicis Galeni* drac. X
Trochiscorum Albandal. dr. III. & scrup. I
Diagrydij drach. II. ꝯ.
Turpethi ,
Stœchados an. drach. V.

Misce cum Syrupo de *Stœchade*, fiat Massa.

Pilulæ Foetidæ.

℞. *Gummi Sagapeni in guttis* ,
Ammoniacy in guttis ,
Opoponacis in guttis ,
Bdellij in guttis ,
Trochiscorum Albandal ,
Sem. Rutæ agrestis , vel
Hortensis sicca ,
Aloës ,
Epithymi an. drach. V.
Hermædactylorum ,
Esulæ præparatæ an. drach. II.
Diagrydij drach. III.
Cinnamomi ,
Spicæ Indicæ ,
Croci ,
Castorei an. drach. I.
Turbith Unc. ꝯ.
Zinziberis drach. I. ꝯ.
Euphorbij scrup. II.

Succi Porri depurati quantum sufficit,
 fiat Massa.

Observandum *Succum Porri* coquendum esse cum paucis Melle.

Pilulæ

Pilulæ de Nitro.

℞. Aloës,
 Trochiscorum Albandal,
 Diagrydii,
 Hellebori nigri flore purpureo,
 Bdëllii,
 Gummi Arabici an. drach. II.
 Euphorbii præparati,
 Nitri an. drach. I
 Misce cum Melle Rosato, & fiat Massa.

Pilulæ Ruffi.

℞. Aloës electæ Unc. II.
 Myrrhæ Unc. I.
 Croci Unc. ss.
 Cum Syrupo Limonum fiat Massa.

Pilulæ Spleneticæ.

℞. Rad. quinque aperient mundat. an. Un. I.
 Corticum Radicum Capparum,
 Tamarisci an. Unc. ss.
 Herb. Fumariæ.

Cardui benedicti,
 Chamædryos,
 Scolopendriæ,
 Eupatorii Cannabini an. m. I.
 Ceterach,
 Lingue Cervinæ,

Brilliant f. a. in sufficienti quantitate aquæ
 Endiviæ ad lib. III. In colatura efferves-
 cant, & macerentur.

Fol. Senæ mundatorum Unc. IV.
 Sem. Anisi,

Fœniculi an. Unc. ꝯ.

In Colatura dissolve

*Aloës lotæ Unc. VI.**Refinæ Scammonii Unc. III.*

Evapora ad consistentiam Pilularum.

Pilulæ de Cynoglossso.**Rx.** *Myrrhæ optimæ drach. VI.**Thuris masculi drach. V.**Rad. Cynoglossi siccatarum,**Sem. Hyosciami,**Opii præparati an. Unc. ꝯ.**Croci,**Castorei an. drach. I. ꝯ.*Misce, & cum Syrupo de Stœchade fiat
Massa. *Opium* tritum cum Syrupo primùm
subigitur, tum reliqua simplicia.**D E E X T R A C T I S.****Extractum Catholicon.****Rx.** *Pulpæ Colocynthis drach. VI.**Agarici albi,**Hellebori nigri,**Pulv. Diarrhod. an. Unc. ꝯ.*Impone Matraccio, cum s. q. Spirit. Vini
extrahatur Tinctura in B. M. tum percola-
tæ adde pulverum*Aloës lucidæ Unc. I.**Scammonii præparati Unc. ꝯ*

Evaporent in consistentiam Extracti.

Eodem modo fiunt Extracta aliarum
Pilularum.

Lau-

Laudanum opiatum.

R. Opi: Thebaici spiritui vini dissoluti paululum cocti & colati Unc. I.

Misceatur cum Tinctura mediante spiritu Vini extractâ ex

Pulveris Diambrae Unc. ss.

Evaporent in consistentiam Pilularum sub finem addendo

Croci Britannici drach. I.

Castorei drach. ss.

Servetur Massa usui.

Resina Scammonii.

R. Scammonii pulverisati q. v.

Superfunde spir. Vini rectific. ad supereminentiam quatuor digitorum transvers. digerantur per dies aliquot in loco calido. Colatura fortiter expressa per chartam bibulam evaporetur. Dein affusione aquæ frigida præcipitabitur ad fundum Resina, quæ abluenda & exsiccanda est.

Eodem paratur modo

Resina Agarici,

Guajaci,

Falappæ &

Magisterium guttæ gambæ &c.

Extractorum conficiendorum Methodus generalis.

Parari possunt *Extracta*, ex omni ferè materia Medica, seu è quovis Medicamento (sive simplici, cujusmodi sunt herbae, flores, semina, &c. sive composito, qualia sunt species, massæ Pilularum, &c.)

quod tincturam menstruo, cui infunditur, communicare solet. Itaque sumatur cujusvis materiæ Medicæ, concisæ, contusæ, vel aliter, ut pro infusione res postulat, præparatæ quantum vis, affundatur *Spiritus Vini*, vel *aquæ Stillatiæ* Medici præscribentis intentioni accommodæ quantum sufficit, maneant in infusione ad calorem Balnei, vel alium lentum, per biduum, plus minus, prout densitas vel tenuitas materiæ postulaverit, donec liquor medicamento tincturâ imprægnetur. Tum liquor tinctus separetur per inclinationem, affuso novo Menstruo, post infusionem, ut prius, separando: idque toties repetendum, quoties Medicamentum de se tincturam liquori impertierit. Liquores tincti conjungantur, per chartam emporeticam agantur; & tandem calore Balnei exhalet humiditas, donec materia in fundo vasis ad mellis consistentiam redigatur, quæ ad usum servanda: cui etiam ad Medici præscriptum nonnihil salis proprii, vel alterius idonei (v. g. scrupuli duo vel semidrachma ad singulas *Extracti* uncias) ut diutius humidum maneat, adjungi potest.

Essentia Absynthii.

R. Absynth. q. v.


Affunde Spirit. Vini q. s. ut extrahatur
Tinctura

Hujus Tincturæ lib. I.

Extract. Absynth. Unc. ss.

Salis Absynth. drach. II.

Commixta circulando digerantur donec probè uniantur.



CLASSIS DECIMA.

*De Trochiscis.***Agaricus Trochiscatus.**

R. *Agarici albi & levis Unc. I.*

Cum s. q. Vini Canarini cui Zinziberis drach. I. sit infusa cogatur s. a. in Trochiscos.

Trochisci albi Rasis, seu Sief alb.

R. *Cerussæ aquâ Rosarum lotæ drach. X*

Sarcocollæ crassioris drach. III.

Amyli drach. II.

Gummi Arabici nitidi.

Tragacanthi an. drach. I.

Camphoræ drach. ss.

Pulverisentur s. a. & cum Albumine ovi aquâ rosarum conquassati fiant Trochisci. Interdum pro arbitrio Medici additur Opium.

Trochisci Alhandal.

R. *Pulpæ Colocynthis albae & levis à Seminibus purgatæ Unc. X.*

Incidatur Pulpa hæc minutissimè, & cum quantitate sufficienti Olei Amygdalarum dulcium recentis fricetur & pulverisetur : deindè sume.

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Bdellii an. drach. III.

Quæ ruditer confusa macerentur in q. f. aquæ *Rosarum* donec dissolvantur, & cum parte lachrymarum solutarum formentur *Trochisci*, qui in umbra siccentur: siccati iterùm minutissimè conterantur, & cum reliqua *Mucilagine* rursus formentur *Trochisci*.

Trochisci hi nihil aliud sunt, quàm *Colocynthis præparata* qui imponi possunt omnibus compositionibus *Colocynthidem* recipientibus: sicut etiam mos huc usquè obtinuit, ut in singulis compositis Pharmacis *Colocynthidem* desiderantibus pro cruda *Colocynthide* *Trochiscos* hos substituamus, quorum quoque usus in Catapotiis acuandis creber esse solet.

Trochisci Alkekengi.

R. Fructuum Halicacabi drach. I. ss.

Sem. Citrulli,

Cucurbitæ,

Melonum an. drach. I. ss. & gr. XV

Boli Armeni,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Sanguinis, id est, Lachrymæ Draconis,

Amygdalarum amararum mundatarum,

Pinearum mundatarum,

Succi Glycyrrhizæ,

Amyli,

Sem. Papaveris albi,

Apii,

Hyosciami,

Carabes, seu Succini albi,

Terræ sigillatæ,

Opii præparati an. drach. I.

Cum succo *Halicacabi*, vel aqua *Rosacea*
in qua ejusdem fructus sicci fuerint mace-
rati, fiant s. a. *Trochisci*.

Trochisci Bechici nigri.

R. Succi Glycyrrhizæ inspissati Unc. II.

Styracis Calamitæ drach. VI.

Sacchari candi albi drach. X.

Specier. Diatragac. frig. drach. I. ss.

Pulv. Ireos drach. ss.

Lohock sani drach. II.

Sacchari Penidii Unc. III.

Sacchari albißimi lib. I. & Unc. I. ss.

Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Hy-
sopi factæ quantum sufficit.

Fiant *Trochisci*.

Trochisci de Capparibus.

R. Corticum Radicum Capparum,

Seminum Agni casti an. drach. III.

Gummi Ammoniaci inguttis drach. II.

Sem. Nasturtii,

Nigellæ,

Fol. Calaminthæ montanæ,

Rutæ,

Rad. Acori,

Aristolochiæ,

Succi Eupatorii inspissati,

Amygdalarum amarar. excorticatarum
an. drach. I.

Fol. Scolopendrii, id est, Ceterach,

Rad. Cyperi rotundi,
Rubiae tinctorum,
Gummi Laccae an. drach. ss.

Ammoniacum in Mortario calido *Aceto*
acerrimo dissolve ad mellis consistentiam,
 cui immisce *Succum Eupatorii inspissatum*
 & *pulveres*, formando f. a. *pastam*, & ex
 ea *Trochiscos*.

Trochisci de Carabé.

Rx. Carabes Unc. ss.
Cornu Cervi usti,
Gummi Arabici tosti,
Tragacanthi,
Coralli rubri usti,
Succi Acaciae,
Hypocistidos,
Balaustiorum,
Mastiches,
Laccae,
Sem. Papaveris nigri assi an. scrup. IV.
Thuris,
Croci,
Opii preparati an. drach. I.
Mucillaginis sem. Psyllii aqua Plantaginis
extractæ q. s.
Formentur Trochisci.

Trochisci Cypheos.

Rx. Pulpæ Uvarum passar. pinguium à cor-
tice & acinis probè mundatarum.
Terebinthinae Cypriæ coctæ an. Unc. III.
Myrrhæ,
Schœnanthi an. Unc. I. ss.

Calami aromatici drach. IX.

Cinnamomi Unc. ss.

Bdellij optimi ,

Spicæ Nardi ,

Cassiae lignæ ,

Radicum Cyperi ,

Baccarum Juniperi an. drach. III.

Asphalati, seu Ligni Aloës an. drach. II. ss.

Croci drach. I.

Mellis Narbonensis despumati q. s.

Vini Canarini modicum.

Myrrba & Bdellium terantur in mortario calido cum Vino Canarino ad crassitudinem liquidi mellis, addatur mox Terebinthina, deindè Pulpa ex carne Passularum per fectaceum extracta; tum pulveres, omnia demùm excipiantur melle despumato ad debitam consistentiam cocto; coganturque in massam ex qua fiant Trochisci.

Trochisci Gordonii.

*Rx. Sem. quatuor frigidorum majorum nuc-
leatorum ,*

Papaveris albi ,

Malvæ ,

Bombacis excorticati ,

Portulacæ ,

Cydoniorum ,

Myrtillorum ,

Gummi Arabici ,

Tragacanthi ,

Nucleorum Pineorum mundatorum ,

Pistachiorum ,

Sacchari Candi ,

Peni-

Penidij ,
Glycyrrhizæ rasæ ,
Mucilaginis seminum Psyllij ,
Amygdalarum dulcium excorticatarum
an. drach. II.
Boli Armeni ,
Sanguinis , id est *Lachrimæ Draconis* ,
Spodij ex ebore ,
Rosarum rubrarum exungulatarum ,
Myrrhæ an. Unc. ꝑ.
 Cum quantitate sufficienti *Hydromelitis*
 fiant s. a. *Trochisci*.

Trochisci Hedychroi.

R. *Ligni Asphalathi* , pro quo *Santali Citrini* ,
Foliorum Majoranæ ,
Mari , pro quo *Dictamni* ,
Rad. Azari an. drach. II.
Phupontici , id est , *Rad. Valerianæ maj.*
Costi ,
Calami aromatici , pro quo *Acori veri* ,
Ligni Aloës ,
Cinnamomi ,
Schoënanthi ,
Opobalsami , aut *Olei Nucis moschatæ* per
expressionem an. drach. III.
Cassie lignæ ,
Folij Malabatri , pro quo *Corticis exte-*
rioris Citri siccati ,
Spice Nardi Indicæ ,
Myrrhæ ,
Croci an. drach. VI.
Amomi , pro quo *Aceri veri Unc. I. ꝑ.*
Mastiches drach. I.

Vini

Vini Canar. quantum sufficit.

Myrrha dissolvatur cum *Vino*, mox *Cro-*
cus, & *Mastiche* probè trita adjiciantur,
 deindè *Opobalsamum*, tunc reliqua in pul-
 verem redacta admisceantur, *Vino* subindè
 affuso, & cogantur in *pastam* ex qua for-
 mentur *Trochisci* in umbra ficcandi.

Trochisci de Myrrha.

℞. Myrrhæ electæ drach. III.

Lupinorum drach. V.

Fol. Rutæ,

Mentastri,

Pulegij Cervini, id est, Dictamni
cretici,

Rubiæ tinctorum,

Semin. Cumini,

Assæ foetidae,

Sagapeni,

Opopanacis an. drach. II.

Dissolvantur *Gummi* in mortario calido,
Aceto Scyllitico, addendo *species*, & cum
 quantitate sufficiente *succi Arthemisiae* co-
 gantur in *pastam*, ex qua formentur *Tro-*
chisci.

Trochisci Scyllitici.

℞. Carnis Scyllæ assatæ lib. I.

Farinae Orobi albi & non rufi Unc. VIII.

Tere in mortario marmoreo, & fiat *pastā*
 ex qua formentur *Trochisci*, qui ponantur
 in superiore parte ædium meridiem spe-
 ctante in umbra, sæpiùs obvertendo, do-
 nec probè ficcati fuerint.

Tro-

Trochisci de terra Sigillata.

℞. *Terræ sigillatæ* ,
Boli Armeni ,
Sanguinis , id est , *Lachrymæ Draconis* ,
Gummi Arabici tosti ,
Rosarum rubrarum exungulatarum ,
Amyli tosti ,
Acaciæ ,
Hypocistidis ,
Lapidis Hæmatitis ,
Balaustiorum ,
Coralli rubri ,
Carabes ana drach. I.
Spodij ex Ebore ,
Margaritarum præparatarum ,
Tragacanthi ,
Sem. Papaveris nigri an. drach. I. ꝯ.
Sem. Rosarum rubr. sive Anthera drac. I.
Portulacæ ,
Cornu Cervi usti ,
Thuris masculi ,
Conorum Cupressi ,
Croci an. drach. II.
 Cum succo vel aqua *Plantaginis* fiant
Trochisci.

Trochisci Viperini.

Aliunde petantur.

CLASSIS UNDECIMA.

De Oleis per expressionem.

Oleum Amygdalarum dulcium.

*Rx. Amygdalarum dulcium siccarum non
tamen rancidarum q. v.*

Contunde in mortario marmoreo minutissimè, & dein ex his tritis & telâ cannabinâ involutis prælo sensim Oleum exprime.

*Eodem modo fiunt.**Olea Amygdalarum amararum.**Sem. Lini,**Papaveris albi &c.*

Oleum Ovorum.

Rx. Ova recentia numero triginta aut plura

Coquito donec penitus induruerint, ex his Vitellos exime, & comminutos in sartagine igne mediocri assa, spatulâ assidue movendo, donec rufescant, & pinguedinem quandam exudent: dein adhuc ferventes sacco cannabino aut pilis contexto excipiantur, & prælo committantur, ut Oleum effluat usui reponendum.

Olea

*Olea Simplicia per Infusionem
& Decoctionem.*

Oleum Rosatum.

℞. Olei Olivarum non rancidi lib. X.

*Rosarum rubr. recent. non penitus aperta-
rum, leviter contusarum lib. IV.*

Misceantur, insolentur, aut loco cali-
do detineantur per viginti dies; dein co-
quantur lento igne, non tamen ad omni-
modam humiditatis consumptionem, po-
stea fortiter exprimantur: expressum *Oleum*
servetur.

Eo quo *Rosatum* modo, fiant & sequen-
tia, eâ animadversione tamen adhibitâ,
ut in coquendis *Herbarum calidarum Oleis*
earum *decoctum* addatur. Item quod *Oleum*
Rosatum, *Cherinum*, *Violarum*, sola etiam
insolatione fieri possint, vel saltem parum
bullire debeant, non autem referre, si ex
Herbis calidis Olea diutius bullierint.

Oleum de Absynth. vulgari & recenti Latifolij

Chamomelinum, ex floribus recentibus.

Liliorum alb. ex floribus abjecto luteo,

Nymphaeae, ex flor. albis abjecto luteo,

Rutae, ex herba virente,

Violarum, ex Violis recentibus.

*Olea Composita per Infusionem
& Decoctionem.*

Oleum de Capparibus.

℞. Corticum Radicum Capparum Unc. II.

Cor-

Cortices mediani Tamarisci ,
Fol. Tamarisci ,
Sem. Agni casti ,
Ceterach ,
Rad. Cyperi an. Unc. ss.
Rutæ drach. II.
Aceti vini acerrimi ,
Vini albi generosi an. Unc. IV.
Olei maturi lib. II.

Macerentur f. a. per biduum , deindè
 coquantur lento igne ad consumptionem
 vini & acetii , Oleum colatum reservetur
 ad usum.

Oleum de Castoreo.

R. *Castorei ,*
Styracis Calamitæ ,
Galbani ,
Euphorbii ,
Cassie lignæ ,
Croci ,
Opopanax ,
Carpobalsami , aut Cubebarum ,
Spicæ Nardi Indicæ ,
Costi an. drach. II.
Cyperii ,
Schoenanthi ,
Piperis longi ,
 nigri ,
Sabinæ ,
Pyrethri an. drach. II. ss.
Olei lib. III.
Vini Hispanici lib. II.

Confice sic , Galbanum & Opopanaxem
 in

96 P H A R M A C O P O E A
in *vino* seorsim dissolve, deindè reliqua
omnia contusa cum *oleo* & *vino* coquito in
duplici vase ad consumptionem *vini*: Po-
steà cola, ac dissolutum & expressum *Gal-*
banum cum *Opopanace oleo* affunde, & ite-
rùm coque sufficienter, ac repone, sæpiùs
miscendo imposterum, ut *Galbanum* &
Opopanax in vasis fundo subsidentia *oleo*
commisceantur.

Oleum Catellorum.

℞. *Olei Olivarum lib. IV.*
Catellos nuper editos Num. II.
Vermium terrestrium vino albo submer-
sorum & lotorum lib. I.
Coctis *Catellis* ad ossium compaginis
dissolutionem, adjeciantur *Vermes* & rur-
sùm coquantur ad humiditatis excremen-
titæ evaporationem, expressioni adde
Terebinthina Cypria Unc. III.
Spiritus vini Unc. I.
Et perficiatur s. a. *Oleum.*

Oleum Croci.

℞. *Croci Unc. ℥.*
Myrrhæ electæ drach. II.
Aceti vini Unc. IV.
Cardamomi drach. IV. & ℥.
Olei Unc. IX.
Crocum & *Myrrham* diebus quinque
macera cum *aceto*, die sexto *Cardamomum*,
septimo cum *oleo* coquantur igne lento ad
aceti consumptionem.

Oleum

Oleum de Euphorbio.

℞. *Staphidis Agriæ*,
Saponariæ an. Unc. ss.
Pyrethri drach. VI.
Calaminthæ montanæ siccæ Unc. I. ss.
Costi drach. X.
Castorei drach. V.

Trita, triduoque macerata in *Vini odoriferi lib. I.* coquantur ad medias. Deinde frica multum diuque manibus, & cola, & cum *Olei Cheyrini lib. I. ss.* coque ad *Vini* reliqui consumptionem : in hoc Oleo solve.

Gummi Euphorbii electi & tenuissimè triti Unc. ss.

Factâ dissolutione calore leni, fiat coctura, *Oleumque* servetur usui.

Oleum Hyperici compositum.

℞. *Summitatum & florum Hyperici ad maturitatem seminis ferè accedent. lib. I.*
Olei veteris clari lib. II.
Vini odoriferi lib. I.

Macerentur tribus diebus ac noctibus, deinde bulliant leniter ad *Vini* consumptionem, postea exprimantur; *novas summitates, Flores, & Vinum* in eodem Oleo macera, coque & cola ut antè, idque tertio fiat, tum forti expressioni adde

Terebinthinæ claræ lib. I.

Croci pulverisati scrup. IV.

Servetur ad usum.

Oleum Lumbricorum terrestriū.

*Rx. Lumbricorum terrestrium vino albo juber-
mersorum & lotorum lib. II.*

Olei Olivarum lib. IV.

Bulliant ad consumptionem humiditatis, colentur, & exprimantur.

Oleum Mastichinum.

Rx. Olei Majoranæ lib. I.

Mastich. electæ grosso modo contusæ Un. III

Sola Diffolutione *Mastichis*, lentissimo calore, sine ulla ebullitione paretur præstans *Oleum*, quod colandum & ita servandum.

Oleum Myrtillorum.

Rx. Baccar. Myrti ruditer contusarum lib. ss.

Olei Omphacini lib. I. ss.

Vini rubri austeri lib. ss.

Coquantur ad consumptionem *Vini*, colentur & exprimantur.

Oleum Mucaginum.

Rx. Rad. Althææ recentium Unc. XX.

Scyllæ recentis in mortario marmoreo contusarum Unc. IV.

Sem. Fœnum-græci,

Lini integrorum an. lib. I.

Macerentur in f. q. aquæ, deindè leniter coquantur, donec remittant crassam, & viscosam Mucilaginem.

Cujus

BRUXELLENSIS. 99

Cujus per Setaceum trajecta lib. II.

Adde

Olei Anethini,

Chamæmelini,

Liliorum alborum an. Unc. XVI.

Coquantur simul ad humiditatis aqueæ
consumptionem, subindè agitando ne
adurantur.

Oleum Vulpinum.

℞. *Vulpem (qua fieri potest) pinguem, æta-
tis mediæ, venatæque circa Autum-
num captam.*

Hanc occide, exentera, carnibusque
post detractam pellem in frusta dissectis,
fractisque singulis ossibus, adde

Vini albi, &

Aquæ fontis an. Lib. X.

Salis marini Unc. III.

Summitatum Anethi,

Thymi,

Chamæpityos an. m. IV.

Coque diligenter despumando ad me-
dias, mox fiat cum expressione colatura:
eandemque recoque cum

Olei veteris optimi lib. IV.

Flor. Salviæ,

Rosmarini an. m. II.

Absumptâ demùm aqueâ humiditate co-
lentur denuò; oleumque ab omni aquositate
immune servetur usui.

*Olea per Destillationem***Oleum Absynthii.****Rx.** *Absynthii jicci q. v.*

Maceretur *Aquâ fontanâ Tartarifatâ* per quatuordecim dies, vel sine maceratione addita *Salis communis s. q.* destilletur per *Vesicam*, & exhibit *Aqua cum Oleo*, separatur *Oleum* per infundibulum, vel vitrum separatorium dictum, & servetur ad usum.

Eodem modo extrahitur :

*Oleum Herbarum Menthæ,**Rosmarini,**Rutæ,**Sabinae,**Sâlviae, &c.**Florum Aurantiorum recentium,**Lavendulæ, &c.**Corticum Aurantiorum recentium,**Citri recentium, &c.*

Qui *Cortices* ab alba parte interiori separantur, contendantur, macerentur, postmodum destillentur ut suprâ.

Oleum Seminum Anisi.**Rx.** *Sem. Anisi contusorum lib. II.**Aquæ fontanæ lib. XX.**Tartari albi crudi pulverisati Unc. II.*

Macerentur per 24. horas, destillentur per *Vesicam*, seu per *Alembicum* cum suo refrigeratorio. *Oleo* cum *aqua* extracto per infundibulum separato, *Aquam* adhibe ad novam destillationem.

Eodem modo extrahitur :

Oleum ex Sem. Anethi,
Carui,
Cumini,
Dauci,
Foeniculi, &c.

Ex Aromat. ut Cinnamomo,
Garyophyllis,
Macere,
Nuce Moschata, &c.

Ex lignis aromaticis, ut Sassafras,
Rhodio, &c.

Oleum ex Baccis Juniperi.

℞. Baccarum Juniperi recentium lib. L.

Contundantur & ponantur in vase terreo cum *Aquæ frigidaë lib. XXIV.* & fermenti acrioris *lib. I.* Reponantur in cella (vase benè obturato) per tres menses; deindè destillantur per Alembicum, vel Veficam cum aquæ simplicis convenienti quantitate. Post separationem Olei per infundibulum, servetur aqua ad novam destillationem.

Eodem modo fit

Oleum ex Baccis Lauri,
Hederæ, &c.

Oleum Ceræ.

℞. Ceræ flavae q. v.

Liquefiat Cera, & à carbonibus, lateribus, vel globulis argillaceis ignitis imbibatur, quæ indentur *Retortæ*, & extrahatur *Oleum in Arena*: quod cum copiosa aqua rectificetur.

Eodem modo destillari poterunt *Olea* ex *Pinguedinibus* : nec non ex *Gummi* & *Resinis*, quæ in pulveres redigi non possunt, Ejusmodi sunt

Ammoniacum,
Caranna,
Opopanax,
Sagapenum,
Styrax liquida,
Tacamabaca, &c.

Oleum de Lateribus.

R. *Lateres* aut *Tegulas rufas antiquissimas*, ex *rufa luto ductas*, easque confringe in frusta mediocria, & in prunis urito, donec excanduerint. Deindè à prunis exempta fragmenta extinguantur *oleo claro veteri*, illicò cooperiendo ne flammam contrahant, ac demittito, donec planè refrixerint, & *Oleo* se impleverint, exempta terantur, pulverem hunc in Retortam ac Cucurbitam vitream luto Chymico lutatam indito, & jungatur recipiens capax juncturis pariter luto obductis, ac per gradus ignis *Oleum* elicito : quod prolectum in Phiala diligenter obturata recondatur.

Oleum Myrrhæ per deliquium.

Aliquot *Ovis* ad duritiem coctis, & per mediam longitudinem incis, *Vitelli* eximantur : Tum albuminum cavitates *Myrrhâ tritâ* ad medietatem impleantur, & denuò

BRUXELLENSIS. 103
denudò conjungantur eorumdem partes,
filoque levitèr constringantur & suspen-
dantur in cella: ut sic *Myrrhæ liquatus*
humor in fictile vel vitreum Vas distillari
queat.


Oleum Terebinthinæ.

R^x. *Terebinthinæ q. v.*

Destilletur per Vesicam, affusâ aquæ
copiâ.



CLAS.



CLASSIS DUODECIMA.

De Unguentis.

Unguentum Ægyptiacum.

℞. *Æruginis subtiliter pulverisatæ Unc. V.*
Mellis Unc. XIV.

Aceti Vini acerrimi Unc. VII.

Coquantur simul igne lento, donec fiat
Unguentum spissum & colore purpureum.

Unguentum album.

℞. *Olei Rosati Unc. IX.*

Cerussæ pulverisatæ Unc. VI.

Ceræ albæ Unc. II. ss.

Post liquefactam in Oleo Ceram, tempe-
 sivè injice Cerussam, moveanturque con-
 tinuò, donec inspissentur, & fiat *Unguen-
 tum.*

Camphoratum fiet, si lib. I. *Unguenti*
 addas *Camphoræ Oleo Rosato tritæ drach. I.*

Unguentum Althææ.

℞. *Olei Mucaginum lib. IV.*

Ceræ flavæ lib. I.

Resinæ puræ lib. ss.

Terebinthinæ Unc. II.

Pulv. rad. Curcumbæ q. s. pro colore flavo.

Liquentur simul leni igne sine ulla co-
 ctione, & colatum per linum, *Unguentum*
servetur usui.

Unguentum Apostolorum.

℞. Olei olivarum communis lib. II.

*Lithargyri auri drach. X.*Coque leni igne affusâ aquæ puræ s. q.
spatulâ continuò agitandò ad unguenti
mollioris consistent. adde*Ceræ flavae,**Resinæ an. drach. XIV.*Liquatis & adhuc tepentibus misce se-
quentia aceto acerrimò dissoluta, colata
& ad mellis consist. cocta*Gummi Ammoniaci drach. XIV.**Bdellij drach. VI.**Galbani,**Opoponacis an. Unc. ss.*

Miscendo his

Terebinthinæ drach. XIV.

Tandem injice pulveres sequent.

*Aristolochiæ longæ,**Olibani an drach. VI.**Myrrhæ Unc. ss.**Æruginis drach. II.*

F. s. a. Unguentum.

Unguentum de Arthanitâ.

℞. Succī Cyclaminis lib. II.

*Fructuum & herbar. Cucumeris agrestis,**Butyri Vaccini an. lib. I.**Olei simplicis lib. II.**Pulpæ Colocynthis Unc. IV.**Polypodij Unc. VI.**Euphorbij Unc. ss.*

Contundenda terantur & macerentur in

Succis

106 P H A R M A C O P O E A

Succis & Oleis per octiduum in vase vitreato probè obturato; postea coquantur ferè ad consumptionem humiditatis, fiatque colatura & expressio fortis, in expresso oleo liquefac

Cerae flavae Unc. V.

Tum,

Rx. Gummi Sagapeni Unc. I.

Myrrhae pulverisatæ drach. III.

Solvantur in mortario calido pistillo calido cum q. s. *Aceti*, teranturque diligenter, donec grumi non appareant, ad formam mellis, his adde

Fellis Taurini ad mellis spissitudinem in Balneo cocti drach. VII.

Ac cum prælieto oleo, in quo *Cera* fusa est, probè misceantur, quibus continuò motis, insperge paulatim pulverem subsequentium medicamentorum,

Scammonij,

Aloës,

Colocynthis,

Mezeræonis,

Turbith an. drach. VII. & ss.

Salis Gemmae drach. IV. & ss.

Euphorbij,

Piperis longi,

Zinziberis,

Chamæmeli an. drach. III.

Fiatque Unguentum s. a.

Unguentum Aureum.

Rx. Olei veteris & clari lib. II.

Cerae Citrinae lib. ss.

Tere-

Terebinthinae Unc. II.

Resinae Pineae,

Colophoniae an. Unc. I. ss.

Thuris,

Mastiches an. Unc. I.

Croci optimi triti drach. I.

Liquefiant in *Oleo*, *Cera*, *Terebinthina*,
Resina, *Colophoniae*: defervescentibus ad-
dantur *pulveres* *Thuris* & *Mastiches*, *Cro-*
cus ultimò inspergatur, & rudicula diligen-
ter misceatur, fiatque *Unguentum*.

Unguentum Basilicon.

℞. *Picis Navalis*,

Resinae Pini,

Sevi Vaccini,

Cerae Citrinae an. lib. I.

Olei communis lib. II.

Liquata commisceantur, & f. s. a. *Un-*
guentum.

Unguent. Enulat. cum Mercurio.

℞. *Pulpæ radicum Enulae campanae* ex aquâ
communi coctæ lib. I.

Pulpæ radicum Oxylapathi, eodem modo
coctæ lib. ss.

Misceantur, & superaffunde

Aceti vini Unc. IV.

Recoquantur ad humiditatis evapora-
tionem; dein fume

Axungiae Porcinae veteris,

Olei veteris an. Unc. IV.

Terebinthinae decocto præscriptarum ra-
dicum lotæ Unc. III.

Cerae

Cerae flavae Unc. I.

Salis communis optimè triti,

Aluminis an. Unc. ss.

Pulv. Rad. Hellebori a'bi,

nigri an. drach. II.

Hydragryri succo Limon. extincti Unc. II.

Axungiae, Cerae, & Oleo liquefactis, adde Pulpas Enulae & Oxylapathi, Salemq̃ue & alios pulveres immisce, ultimò Hydragryrium non solùm succo Limonium, sed etiam totâ Terebinthinâ ad hoc asservatâ, & Axungiae parte in mortario lapideo indefessa agitatione extinctum.

Paretur cum & sine Mercurio.

Unguentum de Glycyrrhiza.

R. Glycyrrh. recentis ac succulentæ Unc. II.

Butyri recentis aquâ Rosarum & solatri aliquoties loti lib. ss.

Pistentur simul in mortario; postea frignantur in sartagine, colentur & exprimantur, hocque tertio iteretur, reassumptâ semper novâ Glycyrrhizâ: tunc sume

Cerussæ mundissimæ pulverisatæ Unc. I. ss.

quæ cum Aceti destillati Unc. VI. coquatur ad pulpæ formam, & Butyro jam preparato commixta diu multumque agitetur.

His adde

Pompholygos drach. II.

Albuminis Ovi conquassati, & in liquorem aquæ instar resoluti drach. VI.

Campboræ oleo Amygdalarum tritæ scr. I.

Fiat s. a. Unguentum.

Unguentum Martiatum.

- ℞. *Herb. Absynthij*,
Abrotani,
Basilici,
Calaminthæ,
Centaur. min.
Chamædryos,
Costi Hortensis,
Majoranæ,
Menthæ aquat.
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci an. Unc. I. ꝯ.
Fol. Lauri,
Rosmarini,
Rutæ an. Unc. III.
Sem. Cumini,
Fœnum-græci,
Urticæ maj. an. Unc. ꝯ.

Omnia minutim incisa & contusa coquantur cum Axungia porcina lib. IV.

Expressis & ab humiditate separatis adde

Olei Nucis Moschatae expressæ &

Tesselatim incisi U. c. I.

Ac ubi ab igne refrixerint

Styracis liquidæ Unc. III.

F. f. a. Unguentum.

Unguentum Neapolitanum.

- ℞. *Axungiae Suillæ recentis non salitæ, à*
membranis probè purgatæ lib. I.

Succi Salvie Unc. IV.

Bulliant simul lento igne ad succi consump-

110 PHARMACOPŒA

sumptionem, in colatura liquefac

Ceræ flavae,

Olei Laurini an. Unc. I.

His ab igne semotis & frigefactis im-
misce exactissimè in mortario

Mercurij crudi Unc. IV.

*Styracis liquidæ, cum Unc. I. Terebin-
thinæ solutæ, Unc. ss.*

Olei Guajaci drach. II.

Fiat ex arte Unguentum.

Unguentum Nervinum.

R. Herb. recent. Salviae,

Ivæ Artheticae,

Majoranae,

Rosmarini,

Menthæ,

Rutæ,

Paralyseos cum flore,

Flor. recent. Lavendulae,

Hyperici,

Camomillæ,

Meliloti,

Summitatum Anethi recentium an. m. I.

Baccarum Lauri,

Juniperi an. Unc. I.

Radicum Pyrethri drach. II.

Incisa & contusa, immergantur in

Oleorum Lumbricorum,

Vulpini,

Anethini,

Hyperici an. Unc. III.

Terebinthinæ Unc. I.

Axun-

BRUXELLENSIS. III

Axungia Humanae ,
Cati sylvestris ,
Canis an. Unc. ss.

Macerentur per septimanam unam vel alteram, postea in Cucurbita semel atque iterum ebulliant, exigua, quæ prodiit, humiditate *herbis & oleis* reaffusa: tum fortiter exprimantur & colentur, in *expresso ac colato* dissolve

Masticis optimè pulverisatæ Unc. ss.

Terebinthinæ Unc. IV.

Ceræ Unc. III.

Benzoini in unciiis duabus Spiritus vini rectificatissimi dissoluti drach. VI.

Et conficiatur Unguentum.

Unguentum Nutritum.

R. Lithargyri auri tenuissime levigati lib. ss.

Olei Olivarum lib. II.

Aceti vini q.s. ad nutriendum in mortario.

F. s. a. Unguentum.

Unguentum Populeon.

R. Oculorum Populi arboris recentium & contusorum lib. III.

Axungie Porcinæ recentis fusæ & colatæ lib. VI.

mixta simul macerentur, donec *Herbæ sequentes* sub initium æstatis colligi possint.

Tunc ,

R. Fol. Bardanæ ,
Hyosciami ,
Lactucæ ,
Mandragoræ ,
Papaveris nigri ,

Sedi

*Sedi majoris,
minoris,*

Solani,

*Umbilici Veneris, ejus loco Crassulæ
Cymarum Rubi teneriorum an. m. VI*

Contusa omnia commisceantur *Axungia* & oculis *Populi* : post aliquot dies adde
Succi Solatri, lib. I.

Coquantur ad humiditatis consumptionem ; colentur & exprimantur.

Post annum invalidum redditur hoc Unguentum , aut contrariarum Virium ; eò quod facilè rancefcat.

Unguentum Rosatum.

Rx. Axungia Porcinæ recentis purgatæ & candidæ q. v.

Cui admisce

Rosarum recentium mundatarum & modicè in pila lapidea contusarum quantum Axungia capere potest.

Macerentur per aliquot dies ; tùm colliquantur & exprimantur : addendo denuò *Rosas recentes* , hocque tertio. In fine decoquantur ad humiditatis consumptionem , etiam affundendo

Aquæ Rosarum lib. I.

Post refrigerationem ducatur pars venditioni exponenda Pistillo ligneo in Vase marmoreo , superaffusâ *Aquâ Rosaceâ* & Unguentum erit gratiosum & candidum.

Balsamum Arcæi.

- ℞. *Therebinthinæ Venetæ*,
Gummi Elemi an. Unc. I. ꝯ.
Sevi Castrati Unc. II.
Axungia Porcinæ veteris, & insulsæ
Unc. I.

Ex omnibus simul liquatis & colatis,
 fiat ex arte Unguentum.

Balsamum Lucatelli.

- ℞. *Olei Olivarum optimi lib. III.*
Terebinth. in aqua rosar. lotæ Unc. VIII
Ceræ lib. I.
Santali rubri pulveris. Unc. II.
Vini Hispanici q. s.
 Coque f. a. addendo circa finem
Balsami Peruviani Unc. I.

Balsamum Viride.

- ℞. *Ol. Olivar.*
Lini an. Unc. IV.
Laurini Unc. ꝯ.
Juniper. drach. II.
Garyophyll. drach. ꝯ.
Aloës, drach. I.
Terebinth. Venet. Unc. I.
Virid. æris drach. II.
Vitriol. albi scrup. IV.
 F. f. a. Balsamum.



CLASSIS DECIMA-TERTIA.

*De Ceratis & Emplastris.***Ceratum de Crusta Panis.**

℞. **C**rustæ panis tostæ, & in Aceto maceratae Unc. II.

Oleorum Mastichini,
Cydoniorum an. Unc. I.

Pulveris Mastiches,
Menthæ,
Spodii,
Coralli rubri,
Santali albi,

rubri an. drach. I.

Farinæ Hordei quantum sufficit.

Fiat Ceratum, semper recens præparandum.

Ceratum defensivum.

℞. Olei Rosati,
Aceti Rosati an. Unc. VI.

Bulliant simul continuò agitando ad consumptionem Aceti, & in Oleo liquentur Cereæ albæ Unc. VI. quibus tepidis immisce sequentia pulverisata :

Boli Armeni,
Terræ sigillatæ an. Unc. II.
Sanguinis Draconis Unc. I.
Balaustiorum Unc. ss.

Et f. s. a. Ceratum.

Em.

Ceratum Matricale.

℞. Galbani Aceto soluti & cocti Unc. I. ℥.

Tacamahacæ,

Assæ foetidæ an Unc. ℥.

Myrrhæ rubræ drach. II.

Pulveris Matricariæ,

Arthemisiæ an. drach. ℥.

Bdellii mollis drach. I.

Pulveris Lapidis magnetis scrup. IV.

Seminis Dauci Cretici scrup. I.

Olei Succini guttulas aliquot.

In Vino albo Gummata dissolvantur, &
additâ Cerae sufficienti quantitate, f. f. a.
Ceratum.

Ceratum Santalinum.

℞. Rosarum rubrarum Unc. I. ℥.

Santali rubri drach. X.

albi,

citrini an. drach. VI.

Cerae albæ drach. XXX.

Eboris drach. VII.

Camphoræ drach. II.

Olei Rosati lib. I.

Misce, & f. f. a Ceratum.

Ceratum Stomachicum.

℞. Mastiches Unc. ℥.

Tacamahacæ,

Ladani an. drach. II.

Balsami Indici veri drach. I.

Terebinthinæ Venetæ,

Cerae albæ an q. s.

Misce, & f. f. a. Ceratum.

DE E M P L A S T R I S.

Emplastrum album coctum.

℞. Olei Olivar.

Cerussæ an lib. I.

Aquæ fontis q. s.

Coque ad Emplast. consist. addendo

Cere albæ Unc. II.

Misce f. Emplastrum.

Emplastrum de Baccis Lauri.

℞. Baccarum Lauri mundatarum Unc. II.

Thuris,

Mastiches,

Myrrhæ an Unc. I.

Olei Laurini drach. VI.

Terebinthinæ parùm coctæ Unc. I. ss.

Cyperī,

Costi an. Unc. I.

Foliorum Rutæ siccorum drach. III.

Sem. Cumini,

Fœniculi an. drach. II.

Mellis despumati quantum satis.

Misce, & f. f. a. Emplastrum.

Emplastrum de Betonica.

℞. Herb. Betonica,

Plantaginis,

Apii,

Verbena,

Pimpinell. an. m. ss.

Incis. & contusis coque leniter cum

Cere

Ceræ flavæ Unc. IV.

Resinæ Pini lib. ss.

Colophon. Unc. ss.

Colat. Express. adde

Terebinth.

Gummi Elemi an. Unc. IV.

Mastich. drach. ss.

F. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Carminativum.

℞. *Gummi Galbani,*

Bdellii,

Ammon. an. Unc. ss.

Thuris masculi,

Myrrhæ rubræ an. drach. II.

Opii Thebaici drach. I.

Dissolve in Aceto Scyllitico iterumque
inspissatis adde

Ceræ citrinæ,

Colophonæ an. drach. III.

Balsami Peruv.

Ol. Philosoph. an. drach. I.

Terræ drach. ss.

Carui stillat. scrup. ss.

Terebinth. Venet. q. s.

F. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Althææ.

℞. *Rad. Althææ pulveris* lib. ss.

Olei Camomillæ,

Anethini an. Unc. II.

Rosarum,

Adipis Anatis an. Unc. I.

Olei Liliorum albor. drach. X.

Emplast. Diachyl. cumgum Unc. III. ss.

Medullæ Vituli,

Vaccæ an. drach. VI.

Adipis Vaccæ Unc. III.

Ceræ flavæ Unc. IX.

F. s. a. *Emplastrum.*

Emplastrum de Cicuta.

Rx. Cicutæ recentis parum contus. q. s.

Sevi Ariet.

Resinæ,

Resinæ Pini an. Unc. IX.

Ceræ citrinæ Unc. VI.

Coq. simul ad humid. consumpt. colat.
fortiter expressæ adde

Gummi Ammoniaci,

Terebint. Venetæ an. Unc. IV.

F. s. a. *Emplastrum.*

Emplastrum Dia-Palma.

Rx. Lithargyri auri,

Olei Olivarum an. lib. III.

Axungie Porci lib. II.

Aquæ communis in qua Salis comm. Unc.

I. soluta est q. s.

Coque f. a. continuò spatulâ palmeâ a-
gitando, donec digitis non adhæreant, adde

Vitrioli albi Unc. IV.

Misce fiat *Emplastrum.*

Emplastrum Dia-chylon simplex.

Rx. Olei Mucaginum lib. III.

Lithargyri auri lib. I. ss.

F. s. a. *Emplastrum.*

Emplast. Dia-chylon cum gumm.

℞. Olei Mucaginum lib. VIII.

*Lithargyri auri lib. IV.**Cerae,**Terebinthinæ an. lib. ℥.**Gum. Ammoniacy,**Galbani,**Opopanacis,**Sagapeni an. Unc. IV.*

F. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Dia-phoreticum.

℞. Gummi Ammoniacy Unc. II.

*Elemi Unc. I. ℥.**Sagapeni Unc. I.*Solvantur in f. q. *Aceti* ad pultis formam,
cui adde pedetentim & quasi guttatim*Cerae flavæ odoratæ lib. I.**Terebinthinæ claræ Unc. III.**Colophonæ, seu Picis Græcæ Unc. IV.*Liquata invicem leni igne, in Sartagine
separatim, & non nimis calidè superiori-
bus *Gummatibus* sensim & alternatim, uti
dictum, sub continua agitatione infusa;
hinc alternatim etiam inspergantur succes-
sivè hi pulveres: utpotè*Pulveris Gummi Bdellii Unc. IV.**Succini Citrini Unc. III.**Olibani,**Masticæ an. Unc. I.**Sandaracis drach. VI.*Post agitentur, donec omnia commixta,
atque dextrè unita sint, per horam inte-

120 P H A R M A C O P O E A
gram in diplomate, vase scilicet duplici
calore leni: fiatque Emplastrum.

Emplastrum Dia-pompholygos.

*Rx. Olei Rosarum cum succo Solatri cocti &
preparati Unc. X.*

Ceræ albæ Unc. VII.

Liquefiant lento igne, remotis ab igne
insperge pulveres sequentes:

Pompholygis preparatæ,

Tutia prepar.

Plumbi usti & lotian. Unc. II.

Cerussæ lotæ Unc. IV.

Thuris masculi Unc. I.

Moveantur continuò ad refrigeratio-
nem, & f. f. a. Emplastrum.

Emplast. Divin. seu Manus Dei.

Rx. Olei Olivar. lib. I.

Lithargyri auri lib. ss.

Aquæ comm. q. s.

Coque ad Consistentiam Emplastri,
cui adde

Ceræ flavæ Unc. IV.

Gummi Ammoniacy,

Galbani colat. & inspiss. an. Un. I.

Terebint. Unc. I. ss.

Olei Laurini drach VI.

Tum insperge pulveres sequentes

Myrrhæ,

Mastiches,

Olibani an. Unc. I.

Lapid. Calamin.

Magnetis.

Terebinthinæ Unc. X.

Mixta simul liquefiant & paululum refrigerescant, tunc adde

Olibani pulverisati Unc. VI.

Misce, & cum Oleo Rosaceo fiant *Magd. leones.*

Emplastrum Gryseum seu de Lapide Calaminari.

Rx. Lapidis Calaminaris uti, & Acetovini extincti, & supra Porphyritem præparati Unc. I.

Litargyri auri Unc. II.

Cerussæ Unc. ss.

Tutiae præparatæ drach. III.

Terebinthinæ drach. VI.

Ceræ albæ Unc. I. ss.

Sevi Cervini Unc. II.

Thuris electi drach. V.

Mastiches drach. III.

Myrrhæ drach. II.

Camphoræ drach. I. ss.

Confice s. a. Emplastrum.

Emplastrum ad fracturas Ossium.

Rx. Rad. & Fol. Consolidæ maj. m. II.

Althææ,

Bacc. Mirthi an. Unc. ss.

Fol. Hyperic.

Salicis an. m. I.

Coq. in s. q. aquæ Chalyb. ad lib. I.

Colat. fortiter expressæ & Mucilaginosæ tum adde

Sevi

Sevi Hircini ,
Olei Rosarum ,
Myrtillor. an. lib. ss.

Quibus liquatis adde
Litargyri auri lib. ss.
Minij Unc. II.

Coque ad consistentiam Emplastri tenuioris , tum in eo liquef.

Ceræ flavae Unc. IV.
Terebinth. Unc. II.

Addendo pulveres sequentes

Boli Armeni ,
Terræ sigillatæ ,
Olibani ,
Myrrhæ ,
Mastichis an. Unc. I. ss.
Sanguinis Draconis Unc. I.

F. f. a. Emplastrum.

Emplastrū Magnetic. Arsenicale.

℞. *Gummi Sagapeni ,*
Ammoniacy ,
Galbani an. Unc. III.

Ceræ ,
Terebint. an. Unc. IV. ss.
Magnetis Arsenicalis Unc. III.
Terræ Vitrioli lotæ Unc. I.
Olei Succini Unc. II.

Misce f. f. a. Emplastrum.

Magnetē Arsenicalē sic conficies

℞. *Antimonii crudi ,*
Sulphuris flavi ,
Arsenici Crystallini an. Unc. II.

Pulve-

Pulveris. omnia subtiliter, & in vase vitreo in arenam calentem imponantur, & tamdiu in illa relinquantur, donec materia ista omnis coliquefcatur, id quod inde cognoveris, si materies stylo ferreo tacta illi adhærescat & *Terebinthina* instar ductitetur, colore est rubea, subobscura, postea infrigidatur: deinde rupto urinali eximitur materia, quæ in unam massam concurrit & dura est instar picis.

Emplastrum de Meliloto.

℞. *Meliloti Unc. VI.*

Florum Camomillæ,
Comarum Absinthii,
Sampsuchi, id est, Majoranæ,
Baccarum Lauri,
Radicis Althææ an. drach. III.
Sem. Apii,
Ameos,
Cardamomi,

Ireos,
Cyperii,
Spicæ,
Cassie lignæ an. drach. I. ꝯ.

Ammoniaci drach. X.

Syracis Calamitæ,

Bdellij an. drach. V.

Terebinthinae Unc. I. ꝯ.

Ficus pingues coctos, & cribratos N. XII.

Sevi Caprini,

Resinæ an. Unc. II. ꝯ.

Ceræ Unc. VI.

Olei

Olei Sampsuchini,

de Spica an. Unc. I.

Decoctionis Meliloti, Camemeli & Fœnum-græci q. s.

Misce, & fiat Emplastrum. Parandi
unt *Magdaleones* crassi, ne exsiccentur.

Emplastrum de Mucilaginibus.

℞. *Mucaginum sem. Althææ,*

Lini,

Fœnum-græci,

Cortic. Medianiæ lmi an. Unc. IV.

Oleorum Camemelini,

Liliorum,

Anethini an. Unc. I. ss.

Ceræ Citrinæ Unc. XX.

Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Sagapeni,

Opopanacis Aceto solut. an. dr. VI

*Terebinthinae Gummis colatis
mixtæ Unc. II. ss.*

Croci drach. II.

Et f. s. a. Emplastrum.

Emplastrum oxycroceum.

℞. *Colophonie,*

Picis nigrae,

Ceræ flavae an. lib. ss.

Liquefcant simul lento igne, & ab igne
subductis immisce diligenter,

Ammoniaci,

Galbani, Aceto maceratorum, coctorum,

℞

Et admellis const. evapor. an. Unc. II.

Terebinthinæ Gummatibus prædictis im-
mixtæ Unc. III.

Postea insperge sequentia tenuissimè
pulverata :

Croci Unc. I.

Olibani ,

Mastichis ,

Myrrhæ an. Unc. II.

F. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Stipticum Paracelsi.

Rx. Minii ,

Lapidis Calaminaris an. Unc. I.

Litargyri auri ,

argenti an. Unc. II.

Olei Lini Unc. III.

Olivarum Unc. IV.

Laurini ,

Juniperi , an. drach. II.

Ceræ ,

Colophonie an. Unc. II.

Gummi Opopanacis ,

Galbani ,

Sagapeni ,

Ammoniacy an. Unc. ss.

Vernicis , seu Sandaracis ,

Terebinthinæ an. Unc. I.

Bdellii Unc. ss.

Carabes Citrinæ ,

Olibani ,

Myrrhæ Alexandrinæ ,

Aloës Epaticæ ,

Aristolochiæ longæ ,

rotundæ an. drach. I. ss.

*Mumie Transmarinæ,**Magnetis Oleo Martis præparati,**Hematites an. drach. II.**Coralli rubri,**albi,**Matris perlarum,**Sanguinis Draconis,**Terræ sigillatæ,**Vitrioli albi an. drach. I. ꝯ.**Florum Antimonii,**Croci Martis adstringentis an. scrup. II.**Camphoræ drach. I. ꝯ.*

Misce & f. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Vigonium, seu de Ranis cum Mercurio.

℞. *Ranas aquaticas viventes N. VI.**Lumbricorum terrestrium vino albo loto-
rum & submersorum Unc. III. ꝯ.**Vini albi lib. II.*Infundantur simul per aliquot horas, tum
bulliant igne moderato ad tertiæ partis
consumptionem, addendo sub finem*Matricariæ cum floribus,**Schœnanti,**Stœchados Arabicæ ana m. I.*

Posteà adjice

*Olei Camamelini,**Anethini,**Liliorum alborum an. Unc. II.**Axungia Porci lib. I.**Pinguedinis Vitulinæ lib. ꝯ.*Bulliant rursus omnia ad Vini tertiæ,
cola-

colaturæ fortiter expressæ adde

Succ. Radicum Ebuli,

Helenii an. Unc. II.

Quibus mixtis , & sensim affusis , nutriantur

Litargyrii auri tenuissimè triti lib. I.

Et coquantur simul lento igne , donec eam consistentiam acquirant , ut digitis non adhæreant , tum adjice , ut liquefiant ,

Ceræ Citrinæ Unc. VI.

Axungia Viper. (si desit) Taxi Unc. II. ss.

Olei Laurini Unc. I. ss.

His ab igne semotis & tepidis , adde

Olei de Spica Unc. II.

Olei croc. sup. Classe XI. descripti Unc. I.

Olibani pulverisati drach. X.

Euphorbii pulverisati drach. V.

Postremò immisce

Terebinthinæ claræ Unc. II.

Styracis liquidæ Unc. I. ss.

Hydrargyrii Terebinthinâ extincti , &

Styraci prædictæ immixti Unc. IV.

Misce , & fiat ex arte Emplastrum , quod cum & sine Mercurio à Pharmacopœo reservari debet.

Spannadrapium ad Fonticulos.

℞. *Emplastri Palmei,*

Dia-chylonis simplicis,

De Cerussa cocta,

Ceræ an. lib. I.

Cinnabaris,

Pulveris Ireos subtilissimi an. Unc IV.

Moschi Olei Amygdalar. soluti gr. VIII.

Fundantur & misceantur s. a. imbibe
telis pro Spannadrappio.

Spannadrapp. Marchionis d'Este.

Rx. Olei Olivarum,

Litargyrii auri an. lib. ss.

Coquantur ad nigredinem, & adde


Cere flavae,

Picis nigrae,

Emplastri Dia-chalciteos an. lib ss.

Omnia probè misceantur, iisque adhuc
calentibus tela tenuis immergatur, & f. s. a.
Spannadrappium.





CLASSIS DECIMA-QUARTA.

*De Præparationibus simplicium
Medicamentorum usualium.*

PRæparata officinarum communiter, & in specie sic dicta, nihil aliud sunt, quàm simplicia nonnulla duriuscula in tenuissimum pulverem, accedente aliquâ aquâ cordiali, redacta, talia sunt: *Terra, Lapides, Perla, Corallia, Crustacea seu Testacea.*

Modus præparandi.

Rem præparandam læviga super Porphyrite lapide versatili quàm minutissimè; inter lævigandum asperge aquam aliquam Cordialem (*Putæ Rosarum, Borraginis, Melissæ & similibus*) ut fiat instar *Pultis*, hanc expone loco tepido, vel aëri, ut in umbrâ exsiccet.

Nota. Quæ solidiora & duriora, adeoque minùs lævigabilia sunt, ustione antegressâ calcinari, friabiliaque reddi solent, ut *Cornua, Ossa, Crustacea & similia.*

Usitiora sunt

Præparationes *Cinnabaris,*
Conchæ,

Coral-

*Corallorum alborum ,**rubrorum ,**Cornu Cervi usti ,**Chel. Cancror.**Cryſtalli ,**Granati ,**Hematitis ,**Hyacinthi ,**Lapidis Armeni ,**Calaminaris ,**Judaici ,**Lazuli ,**Magnetis ,**Margaritarum ,**Matris Perlarum ,**Oculorum Cancri ,**Ovorum Struthii ,**Saphyri ,**Smaragdi ,**Spodii ,**Tutiae.*

Not. Quod ad confectionem Alkermes
Lapis Lazuli uratur in crucibulo, postea, ut
 supra terendo & lævigando, in tenuissimum
 pulverem redigatur.

Aluminis uſtio.

Rx. *Aluminis Rochæ quantum volueris.*

Indatur vasi figulino non vitreato, &
 igne circumquaque accenso, aduratur do-
 nec ampullas ampliùs non emittat.

Butyri Majalis præparatio.

Rx. Butyri insulsi sub mensis Maii finem confecti q. v.

Indatur vasi terreo vitreato, & Balnei vel solis calore lique scat : supernatans Butyrum per inclinationem separetur à fero subfidente; & Colatum, idoneo loco sine sale recondatur, in annum usum.

Cochlear. Testarum præparatio.

Rx. Cochlearum oblongas Testas, quæ propè piscinas & lacus reperiuntur, his affunde *Acetum destillatum*, stent in infusione per noctem ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades, postea pulverisa, & cum aqua *Cardui Benedicti* in marmore præpara : volatilis enim, illarum cinis per calcinationem aliàs factus nullius est pretii, nec operationis in usu.

Cornu Cerv. spagyrica præparat.

Calcinatio hæc commodè in Vesica perficitur coctione continuâ mediante destillatione aquarum *Acetosæ*, *Cardui Benedicti*, *Calendulæ*, *Scorzoneræ* & similium, per cujus vaporem *Apices Cornu* in collo Alembici, quâ parte attingi & penetrari queant, suspensi, jucundo & miro modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis vires aliàs exurentibus (ut in vulgari calcinatione fieri solet) mollescant &

& calcinentur secundum artem, & ferventur ad usum.

Millepedum præparatio.

℞. *Millepedum vivorum* q. v.

Diligenter à fordibus purgentur, deinde *Spiritu vini dephlegmato* inebrientur, & calore moderato siccentur.

Opii Correcti præparatio.

Opium frustulatim & in teneras lamellas conscissum collocetur supra laminam ferream, quam super carbones accensos leniter incalescere, & *Opii sulphur Narcoticum* sensim exhalare sine, quousque non amplius fumum vel vaporem emittat, cavendo tamen ne comburatur; sed ut solummodò torrefiat, & hæc facilis est & compendiosa, genuina tamen *Opii* præparatio.

Plumbi ustio.

℞. *Plumbi* q. v.

Liquefcat in fictili novo & injice *Sulphuris pulverisati* q. s. ignem succendito flagrans plumbum spatulâ ferreâ versetur donec prorsus in cineres redigatur.

Scammonii præparatio.

Scammonium super chartam bibulam ex-

pansum fumo sulphuris suffumigetur, id studiosè cavendo ne lique scat, sed lentissimo calore fumo sulphuris imbuatur.


Tuthiæ præparatio.

R. Tutia officinarum, seu Cadmiæ Græcorum quantum volueris.

Ter saltem in Crucibulo candefacta, ter aquâ Rosarum & Plantaginis extinguitur, deindè super marmor in subtilissimum pollinem lævigata, cum aquâ Plantaginis & Rosaceâ redigatur in pastillos.

Plures aliorum simplicium, utpotè *Radicum, seminum & similibum*, præparationes variis in dispensatoriis reperiuntur, quorum nonnullas, tamquam inutiles & non necessarias refutamur, nonnullas verò Medicorum judicio & præscriptioni relinquimus.





CLASSIS DECIMA-QUINTA.

*De quibusdam Medicamentis
spagyricis.*

Crocus Martis adstringens.

℞. **L** *Imaturæ Chalybis benè depuratæ tenuioris lib. ꝯ.*

Extende super Tegulam latam & planam, exponendam igni *Figulino*, aut *Reverberii*, spacio octo vel decem dierum, sic ut Tegula à flammâ continuâ, continuò ardeat, & limatura reducetur in pulverem inpalpabilem, spongiosum, subrubrum, usui reponendum.

Crocus Martis cum Sulphure præparatus.

℞. *Sulphuris Magdaleon* applica ignito *Chalybis Bacillo*, ut candentes & liquecentes guttæ in subjectam pelvim aquâ frigidâ plenam incidant: repete illum laborem ad *Chalybis* totalem fusionem, decanta postea aquam, & igniatur repertus pulvis in Crucibulo, reverberandus ad *Sulphuris* consumptionem, & usui, dum refrixerit, reponendus.

Magisterium Martis aperitivum.

Rx. Succi Oxalydis recenter expressi & per subsidentiam depurati lib. VIII.

Pulpæ Tamarindor. pinguium Unc. XVI

Confricentur manibus, vel pistillo ligneo in patina terrea, non stannea, & fiat instar *Pulmenti*, postea coquatur parùm, & clarificetur per laneum pannum, clarificatum indetur Cucurbitæ vitreæ, cui adde *Limaturæ Chalybis à sordibus benè purgatæ Unc. VIII.* digerantur in arena loco calido per quatuor vel quinque dies & noctes, Cucurbitæ superponatur Alembicus cæcus, ut materia per intervalla agitari possit spatulâ ligneâ, per digestionem coletur per chartam emporeticam in patinam vitream vel terream, deindè inspissetur lento igne ad consistentiam Extracti liquidioris. Residuum *Chalybis* in subtilissimum pulverem redactum, exsiccetetur & usui servetur.

Tinctura Martis aperitiva.

Rx. Limaturæ Chalybis per abluitionem purificatæ lib. ss.

Tartari albi Germanici Crystallini, præparati & pulverisati lib. II.

Misce exactè, & inde ollæ ferreæ valdè capaci & magnæ, addendo *Aquæ pluvialis purissimæ lib. XXIV.* (observando, ollam ultrâ medietatem non esse replendam, alioquin materia, quæ bulliendo intumescit &

& inflatur, majori ex parte parietes Ollæ transiliret) bulliant omnia benè per integrum diem, addendo per intervalla aquam bullientem (quæ in defectu præcedentis, semper debet esse ad manum) commoveatur continuò materia, quæ alioquin semper albicans apparebit. Post duodecim horarum ebullitionem, quod crassius est, subsidebit, subtilius verò supernatabit nigricantem præ se ferens Colorem saporis dulcacidi: decanta quod clarum erit, filtretur, & in vase terreo vitreato evaporetur lento igne ad consistentiam Syrupi liquidioris.

Vitriolum Martis.

℞. *Spiritus Vitrioli rectificati lib. III.*

Aquæ pluvialis lib. IX.

Misce, tum accipe

Limaturæ Chalybis purissimæ lib. I.

Projice *Limaturam* in Matrarium vitreum amplum, & pedetentim superaffunde tres partes superioris mixturæ, *Spiritus* & *Aquæ* scilicet. Digerantur super cineres calidos per tres dies; tum liquorem viridem per declinationem decanta in alio vitro, & si ex *Limatura* quidquam indissolutum restitet, illi reliquam partem dissolutionis adde, & digere super cineres, ut dictum est: deindè decanta, & junge primæ dissolutioni, rejiciantur verò fæces tamquàm inutiles. Filtrentur omnes dissolutiones, & evaporentur in vase vitreo igne len-

138 P H A R M A C O P O E A
lento, ad consumptionem medietatis, deindè ponantur in cella vinaria, vel loco frigido per tres dies, tum collige *Cryſtallos Vitrioli*, reliquam humiditatem decantata, evapora, & cryſtallifa, ut ſuprà: Poſteà exſicca *Cryſtallos*, & uſui ſerva in Vitro benè obturato.

Saccharum Saturni.

℞. *Ceruffæ optimæ q.v.* (Belgicè *Schelpwit*)
Huic ſubtiliſſimè pulveriſatæ affunde Acetum ſtillatitium ad ſupereminentiam trium vel quatuor digitorum tranſverſorum: ſtent in digeſtione donec Acetum dulce factum fuerit; dein Aceti decantati levi igne fiat evaporatio ad cuticulæ apparentiam, ſic in loco frigido concreſcent Cryſtalli in umbra exſiccandi: reliquum denuò ad cuticulæ apparentiam exhalet, & procede ut antè.

Mercurius ſublimatus Corroſivus

Hunc aliundè petere licet.

Mercurius dulcis.

℞. *Mercurii ſublimatei Unc. VI.*
Mercurii vivi Unc. IV.

Miſce exactè in mortario marmoreo uſquè dum Mercurius vivus planè diſpareat. Pulvis hic indatur matraccio colli oblongi in arena poſito, & ſucceſſivis ignis gradibus
Mer-

Mercurius eleuetur in altum. Materia autem exempta denuò sublimetur, idque toties repetatur, donec Mercurius sit planè insipidus rejiciendo semper pulverem rubrum in fundo matraccii hærentem.

Mercurius præcipitatus albus.

℞. *Mercurii crudi Unc. I.*

Aquæ fortis Unc. I. ꝯ.

Stent in loco calido, donec Mercurius solutus sit atque in totum dispareat. Solutionem hanc stillatim cum muria forti confundito. Sic præcipitabitur pulvis albus aquâ calidâ crebriò abluendus, donec omnem acrimoniam deposuerit & blando calore inter chartas complicatas exsicce-
tur.

Mercurius præcipitatus ruber.

℞. *Mercurii crud. Unc. I.*

Aquæ fortis Unc. I. ꝯ.

Detineantur super arenam in phiala vitrea donec Mercurius sit solutus, dein valido igne f. evaporatio ad siccitatem.

Mercurius præcipitatus Viridis.

℞. *Mercurii Unc. IV.*

Veneris Unc. ꝯ.

Solve separatim in aqua forti vel Spiritu nitri & misce, postea abstrahere aquam fortem digere, præcipitatum cum Aceto stillatitio, filtra, & sicca f. a.

Tur-

Turpethum Minerale.

℞. *Mercurii crudi Unc. IV.**Olei Vitrioli Unc. XVI.*

Misceantur, retortæ vitreæ imponantur, & simul macerentur per viginti quatuor horas super cineres calidos, quibus elapsis, inclinato rostro adaptetur recipiens aucto paulatim igne, deindè augeatur, donec omnis humiditas abierit. Massa alba à fœcibus separata projiciatur in aquam puram, & statim flavesct: abluatur ab acrimonia, siccet, & usui servetur.

Antimonium Diaphoreticum.

℞. *Antimonii crudi lib. ℥.**Sal. Nitri lib. I. ℥.*

Mixta exactè & in pulverem subtilis. redacta per vices & cochleatim in crucibulum candens injiciantur & fiet detonatio: post detineatur materia in igne per horam dimidiam ità tamen ne fluat. Dein eam cum crucibulo injice in aquam calidam pluvialem, quæ illicò lactescet, liquorem hunc albicantem effunde, & recentem aquam fœcibus reaffunde, idque tam diù repetatur, donec liquor ampliùs non lactescat: liquores istos omnes à pulvere subsidente effunde. Pulvis autem insipidus restans lentè exsiccet.

Notent Pharmacopœi quod hic Pulvis semper recens esse debeat, & aëri sæpè expositus, iterùm qualitatem Vomitivam acquirere.

Crocus Metallorum.

℞. *Antimonii optimi*,
Salis Nitri purissimi an. lib. 1.

Reducantur seorsim in pulverem, mox commisceantur : tum injiciatur hujus mixturæ Uncia una in Crucibulum candens igne carbonum, cum Cochleari vel alio instrumento commodo, & tegatur illicò tegulâ, ut sic fiat detonatio, fumum evitando ; & cùm universa materia jam deflagaverit, ac stridor cessaverit, injice aliam Unciam mixturæ, iterùmque hunc laborem repete ignem augendo, donec tota deflagaverit, tum removeatur ab igne, ut quam primùm refrigescat ; tandem fracto vase, materia metallina fusco rubore prædita (quæ proptereâ *Hepar Antimonii* appellatur) separetur à crusta albicante.

Regulus Antimonii Martialis.

℞. *Frustror. Chalyb. purioris Unc. IV.*

Candesciant optimè in Crucibulo, hinc super injiciantur

Antimonii crudi crassè pulveris. Unc. VIII.

Quæ simul liquefiant, his liquatis adde
Nitri Unc. II.

Sicque fluant igni imposita per horam. Deindè effunde materiam in Conum fusorium, conusque parùmper concutiat, ut sic regulus descendat, qui jam refrigeratus à Scoriis est separandus. Hic regulus
 iterùm

142 P H A R M A C O P O E A
iterum fundatur, tantillum sensim injicien-
do Nitri : quo perfecta magis fiat scoria-
rum separatio. Tandemque rursus in co-
num effusus regulus ita remaneat usque
ad perfectam refrigerationem.

Anti-hecticum Poterii.

Rx. Reguli Antimonii Martialis,
Stanni Anglici an. q. v.

Colliquantur simul & cum triplo
Salis Nitri,

Detonentur & postea aqua edulcorentur

f. a.

Butyrum Antimonii.

Rx. Antimonii crudi,

Mercurii sublimati corrosivi an. q. v.

Misceantur exacte in mortario lapideo,
& fiat destillatio per retortam Vitream la-
tioris Colli in arenam, adauctis successive
ignis gradibus, sic liquor sive Butyrum An-
timonii instar glaciei egreditur, qui si con-
crescat in Collo, vel principio recipientis
ne id obstruat, admove cautè Carbonem
vivum, ut liquefeat, liquorem egressum
rectifica per retortam vitream.

Bezoardicum Minerale.

Rx. Butyri Antimonii, q. v.

Alteram partem *Olei glacialis Antimonii,*
prius ponderatam, & injice in Matracium
fatis

satis amplum, cui affunde guttatim æquale pondus *optimi Spiritûs Nitri*. Interim cave à noxiis vaporibus. His additis, & dissolutione peractâ, effunde in Alembicum parvum, & igne arenæ destilla usque ad siccitatem. Affunde iterùm relicto pulveri in Alembico jam ficcato, eandem *Spiritûs Nitri* quantitatem, tunc *Spiritus Nitri* nihil efficiet; exhalare tamen eum fac destillando, usque ad materiæ siccitatem. Affunde tertio eandem *Spiritûs Nitri* quantitatem, & ut antè destillando evaporare finito. In fundo Cucurbitæ reperies materiam albam, siccam & friabilem, quam in pulverem redactam, diligenter ad usum serva.

Vitrum Antimonii.

℞. *Antimonii in subtiliss. pulv. redacti q. v.*

Calcinetur in patina terrea vitreata primò leni igne per horas aliquot, dum fumi cessare incipiant spatulâ lignèâ continuò agitando ne in glebas concreascit: dein auge ignem ad incandescentiam vasis donec in pulverem abeat Griseum, hunc funde in Crucibulo donec instar Cerae fluat, postea effunde suprà laminam cupream antea leviter calefactam: lentè frigescent omnia ne vitrum diffiliat.

Vinum Emeticum.

℞. *Croci Metallorum Unc. I.*

Vini

Vini albi lib. I.

Misce, & stent per horas duodecim in infusione calidâ. Deindè usui servantur.

Tartarus Emeticus.

℞. *CrySTALLORUM Tartari Unc. I.*

Croci Metallorum Unc. ss.

Pulverisata coquantur cum aquæ pluviælis s. q. ad Pelliculæ apparentiam; hinc colata per chartam bibulam duplicatam, & Vitro inclusa loco frigidiori ad CrySTALLIFANDUM reponere.

Tinctura Antimonii.

℞. *Mineræ Antimonii lib. I.*

Sal. Tartari lib. II.

Detineantur in igne vehementissimo per sex vel octo horas, dein refrigeratis omnibus massa pulverisetur, huic pulveri superfunde Spiritum Vini Tartarificatum ad supereminentiam aliquot digitorum, digerantur simul per tres vel quatuor dies donec sanguinis instar rubicunda evadat Tinctura, materiam sæpiùs agitando, dein ad usum à fœcibus separata reponatur. Spirit. Vini Tartarific. sic conficies

Spiritus Vini Tartarificatus.

℞. *Tartari crudi Unc. VIII.*

Salis Tartari Unc. IV.

Spiritus Vini lib. VIII.

Dige-

Digerantur per diem unum, dein destillentur ad mediæ partis abstractionem, destillat. Spirit. superfunde

Salis Tartari Unc. II.

Tartari crudi Unc. IV.

Destill. denuò ad mediæ partis abstractionem usui servandum.

Vitriolum album Vomitivum.

Rx. Vitrioli albi q. v.

Solve in aquâ pluvîâ, filtra & evapora donec crusta apparere incipiat. Pone in loco frigido, Crystallos concretos exime. Aquam restantem iterum evapora & tertio, dum omne sal purum exceperis. Quod ultimò cum Aqua Rosarum solutum, Filtratam, & coagulatum calore levi ficcetur ad usum.

Oleum Vitrioli.

Rx. Vitrioli optimi ad cineritium flavescens Pulverem exsiccati q. v.

Destilletur s. a. ex retortâ lutatâ, servatis ignis gradibus. Oleum destillatum postea rectificetur, servato seorsim capite mortuo, seu *Colcothar*.

Flores Sulphuris.

Rx. Sulphuris purissim. q. v.

Sublimetur ex Cucurbitâ terreâ vitratâ,
K super

146 P H A R M A C O P O E A
superimposito Alembico vitreo vel terreo
vittrato, per mediocrem arenæ calorem, flo-
resque colligantur usui servandi.

Oleum Sulphuris.

Rx. Sulphuris q. v.

Imponatur crucibulo, & accensum de-
stilletur superimpositæ campanæ vitreæ,
ut artis est.

Balsamum Sulphuris Vulgare.

Rx. Florum Sulphuris Unc. II.

Sal Tartari Unc. I.

Misceantur & liquefiant exacte, donec
atro purpureum induant colorem, hæc
postea Pulverisatis adde

Olei Terebinthinæ Unc. IV.

Coq. simul in Phiolâ vitreâ in arenâ re-
posita per tres horas : dein omnibus fri-
gefactis, clarum à sæcibus separa & ad usum
serva.

Balsamum Sulphuris Anisatum.

Rx. Massæ Sulphuris supra scriptæ Unc. II.

Olei Anisi Unc. III.

Coq. in B. M. per octo horas, mate-
riam sæpius agitando, postea frigefacto va-
se, Oleum supernatans tinctum usui re-
ponatur.

Flores Benzoin.

Rx. Benzoin optimi pulveris. q. s.

Ex ollâ terreâ ad formam cucurbitæ facta, cui super impositus est conus Chartaceus, igne leni f. sublimatio : sic post horam dimidiam flores ascendere incipient, qui singulâ horâ semis cum plumaceola colligendi sunt.

De Salibus fixis & Volatilibus.

Sal Absinthii,

Cardui Benedicti,

Scordii,

Stipitum Fabarum &c.

Herbæ siccatae exurantur in cineres, ex quibus per aquam calentem fiat lixivium quod filtrandum & lento carbonum igne evaporandum in sal, quod, ut purius redatur, iterum solvendum, filtrandum, & coagulandum.

Cryſtalli Tartari.

Rx. Tartari Rhenani pulveris. q. v.

Ebulliat cum multâ aquâ, quæ sic imprægnata, dum adhuc calet, per chartam bibulam coletur in vas idoneum, deinde si frigori per noctem aut diutius exponatur, Cryſtalli lateribus vasis accrescent, quos effusâ aquâ colligito & siccat.

Tartarus Vitriolatus.

℞. *Liquoris Tartari q. v.*

Instilletur ei successive Oleum Vitrioli rectificatum donec nulla amplius f. effervescentia, dein f. evaporatio ad siccitatem.

Sal fixum Tartari.

℞. *Tartari albi crudi q. v. vel*

Massam nigram post distillationem Tartari in retortâ residuam.

Tartarus crudus in furno figulino; massa verò nigra nude inter prunas calcinetur donec alba evaserit, ex hac per aquam calidè affusam paretur lixivium, quod filtretur in vas vitreum vel terreum, effundatur & exhalet donec omnis humiditas sit absorpta, sic in fundo remanebit sal album.

Quod si per dies aliquot vase vitreo pleno exceptum in cellâ aëri exponatur, solvetur in liquorem *Oleum Tartari per deliquium* improprie vocatum.

Sal Prunellæ.

℞. *Nitri purissimi pulveris. lib. I.*

Liquefiat in crucibulo, liquefacto per vices insperge

Sulphur. comm. Unc. I.

Quod deflagrato, effunde nitrum fufum
in

in pelvim cupream mundam, fiantque lamellæ.

Sal nitri fixum ejusque Liquor.

Rx. Nitri purissimi Unc. III.

In pulverem subtilem redactum indatur crucibulo mundo imponendo carbonibus accensis ut fiat instar aquæ: cum fluxerit injice frustum carbonis igniti & fiet inflammatio, donec injectum illud frustum effervescendo cum nitro sit consumptum, tum repete illam carbonum injectionem donec nitrum non amplius inflammetur sed maneat sub massa siccâ virescente, tum

Rx. Nitrum hoc modo fixatum.

Solvatur in aq. ferventis q. s. solutum filtra per chartam. Filtrati f. evaporatio in vitro idoneo ad siccitatem usque, & remanebit in fundo sal acerrimum.

Hoc sal in orbe vitreo in cellâ aëri exponatur, tam diu illic relinquendum donec per deliquium fuerit solutum in liquorem limpidum *alcabest glauberi* dictum.

Salis Essentialis conficiendi mod.

Rx. Plantæ cujusvis recentis & succul. q. v.

Contund. in mortario lapideo, deinde affusâ copiosâ aquâ font. clarâ coq. ad mediet. consump., decoctum coletur for-

titer exprimendo, Colat. iterum coquatur ad Mellis consistent., reponatur in vase fictili vitreato loco frigido per octiduum, & Sal Crystallinus concrefcet, qui, affuso decocto colligitur, propriâ aquâ abluitur & ficcatur ad ufum.

Spiritus Cornu Cervi.

Rx. Frustulorum Cornu Cervi q. v.

Indantur retortæ ad medietatem implendæ post amplo recipiente adaptato fiat destillatio igne aperto gradatim: sic ascendent Phlegma, Spiritus, Sal Volatile & Oleum fætidum: Sal Volatile cum liquore reliquo ab Oleo fætido per filtrationem separato. Mixtum in Cucurbitâ altiore super arenam destillando rectificetur: Sal Volatile Spiritui admisceatur, vel singula separatim asserventur pro lubitu.

Sal Volatile Cornu Cervi.

*Rx. Spiritum Cornu Cervi ab Oleo separatum.
Sal Cornu Cervi primâ destillatione collectum.*

Excipiantur phialâ superposito alembico & recipiente vasi huic adaptato: lenissimo sed gradatim aucto igne ascendet Sal Volatile Alembici rostro & lateribus adhærens, quod separatim excipiendum.

Sal Volatile & Oleum Succini.

℞. *Succini contus. q. v.*

Indatur retortæ ut tertia ejus pars repleatur, destilletur gradatim ignem augendo, ita simul ascendent Oleum & Sal Volatile, hoc Sal aquâ calidâ eluatur & seorsim super proprium residuum calcinatum rectificetur ut album evadat. Oleum autem per se s. a. rectificetur.

Spiritus Salis Armoniaci.

℞. *Salis Armoniaci lib. I. ꝯ.*

Tartari lib. ꝯ.

Seorsim pulverif. & commixta indantur Cucurbitæ Vitreæ benè munitæ affundendo aquæ communis *Unc. XXXII.* destillentur leni calore in arena *Unc. XVI.* Spiritus reliquus minùs potens seorsim aservetur.

Flores Salis Armoniaci.

℞. *Salis Armoniaci,*

Marini decrepitati an. q. v.

Pulverifata & mixta indantur Cucurbitæ figulinæ, cui in arenâ positæ cæco capitulo adaptato sub initio ignem lenem adhibito, eumque sensim adaugeto quo usque Sal Armoniacum sub farinæ formâ ascendat, dein ignem continuato & cum nihil

152 P H A R M A C O P O E A
amplius ascendere animadvertitur, vasa
refrigescere permittito, capitellum remo-
veto & flores pennâ colligito.

Spiritus Nitri.

℞. *Nitri purissimi lib. I.*

Boli communis lib. III.

Exacte mixtis f. f. a. destillatio per re-
tortam.

Spiritus Salis.

℞. *Salis Marini albi lib. II.*

Laterum pulveris lib. VI.

Exacte mixta indantur retortæ terreæ
ad medietatem adaptato amplo recipiente,
primò parcâ manu ignis adhibeatur, qui,
phlegmate egresso, augeatur donec omnes
Spiritus nebularum instar egressi sint, Spiri-
tus à phlegmate rectificatione separetur.

Spiritus Salis Dulcis.

℞. *Spiritus Salis optime dephlegmati Unc. III*
Vini rectificati Unc. IX.

Destillentur f. a. per Alembicum Vi-
treum.

Lapis Infernalis.

℞. *Argenti Copellæ tenuiter laminati Unc. I.*
Aquæ fortis Unc. II. ss.

Dissol-

Diffolvantur igne lento in Vase vitreo strenuo, postea coquantur vase aperto, igne arenæ, sub camino, cavendo à fumo, ad humiditatis superflue consumptionem, postea effunde in conum fusorium, prius calefactum, & refrigeratus Lapis fervetur ad usum.

Ruptorium Commune.

Fit ex lixivio fortissimo secundum artem exsiccat.

Lapis Medicamentosus Crollii.

℞. *Vitrioli viridis lib. I.*

albi lib. ss.

Aluminis crudi lib. I. ss.

Anatron, id est, Fel vitri.

Salis communis an. Unc. III.

Salis Tartari,

Abfinthii,

Artemisise,

Cichorii,

Perficarie,

Plantaginis an. Unc. ss.

Ponantur in Olla vitreata, & affunde parùm *Aceti Rosati*, ac coque igne lento sæpiùs agitando: ubi incipiet crassescere, adde

Cerussæ Venetæ,

Boli Armeni an. Unc. IV.

Misceantur omnia diligenter, donec

vi ignis mediocris in Lapidis duritiem *Massa* concreverit, quæ postea fractâ ollâ eximenda, & ad usum probè asservanda.

Si *Gummata*, *Myrrham* videlicet & *Thus*, volueris addere, instituatur coctio lenta, ne comburantur, & vis illorum in igne evanescat.


Aqua Fortis.

℞. *Vitrioli siccati lib. II.*

Salis Nitri lib. I.

Trita simul misceantur, & destilla per retortam Loricatam, igne aperto, per gradus.





CLASSIS DECIMA-SEXTA.

De Cognitione & delectu Medicamentorum simplicium.

IN gratiam Tyrinum additus est Tractatus iste, de Cognitione & delectu Medicamentorum simplicium; non omnium quidem, sed præcipuorum & magis necessariorum, ex variis Authoribus collectorum, & Ordine Alphabetico dispositorum, prout sequitur.

Accacia Arbor est, ex cujus femine maturo, ejusdem nominis succus exprimitur nigricans: ex immaturo rubescens, seu subfulvus. Ex hîc vera veterum *Acacia*, quæ *Theriacam* ingreditur, recipiendaque est, ubi *Acaciæ* simpliciter mentio fit. Ex omnibus præstantissima perhibetur *Luteo-rubra* odoris grati.

Æris Flos, æris scobe tenuissimè delimatâ polluitur. Optimus est friabilis, in attritu fulvescens, milii effigie, ponderosus, gustu adstringens & modicè splendens.

Æris Scoria, est recrementum illud Spongiarum modo spumofum, quod Fabri tam de ferro quàm ære abjiciunt.

Æris

Æris Squamma, est fragmentum, sive ramentum quod malleis æri excutitur, quâ de causa æris rudis Squamma cæteris præfertur, ex qua Clavi fiunt. Probatur crassa, rufa præsertim æruginosa.

Ærugo, est æris veluti rubigo in æreis vasis, laminis, squammis, scobibus, lapidibus concreta, decem diebus *Aceti acerimi* vapore, post decussa vel derasa.

Æs ustum probatur rubrum, contusu Cinnabarinum colorem imitans: nigrum verò, plus quam decet, exustum est.

Agaricus fungus est arboribus adnascens Laryci: estque duplex, & ratione sexûs mas & fœmina, & ratione coloris candidus & niger. Probatur *Agaricus*, qui candidissimus est & levis, item friabilis, minimè lignosus, rarus, primò statim gustu dulcis, mox amarus, astringens, ac etiam subacer, qualis est qui fœmina nominatur; qui verò nigricans, densus, ponderosus, filis quibusdam veluti nervis intersectus, acerbusque maximè improbatur: quin & qui corrosus, & qui propè caudicem est.

Aloës, alia est *lucida* seu *succotrina*, alia *hepatica*. Præstantissima est *succotrina*, seu *lucida*, quæ est pinguis, glutinosa, transparens ex rubro rufa, *Hepatis* modo coacta, boni odoris *Myrrham* æmulantis, sincera, friabilis digitis, arenarum & calculorum expers, facilè liquefcens, & eximiæ amaritudinis. *Hepatica* non tam boni odoris est ut *succotrina*, nigrior fractuque contumacior est.

Aloës Lignum eligitur Indicum, colore nigro, cinereis venis discurrentibus, ponderosum, ita ut sua gravitate in aquam coniectum non innatet, sed subsideat, durum, crassum, quodque accensum flammam diù retineat, humidâ pinguedine prægnans. Quò majora sunt fragmenta, eò plus facultatis in se continent.

Ambra optima censetur *Grysea odoratissima*, quæ à sordibus maximè repurgata est, quæque plurimùm ad candorem accedit, quæ videlicet cinerei sit coloris, aut quæ ex venis nunc cinereis, nunc candicantibus constet, levis, pinguis, & si ejus fragmentum candenti fero applicatum, veluti in Oleum resolvatur. Pessima est nigra, & vilis, quâ odor *Chyrothecis* conciliatur.

Ammoniacum probatur benè coloratum, *Tigni*, *Calculorum*, ac aliarum sordium expers, *Thuris* similitudine, minutis glebis, densum, sincerum, odore *Castoreum* utcumque referens, & gustu amarum. *Ferule* Succus est, quæ in *Africa* gignitur juxtà Ammonis Oraculum.

Amylum, *Amidum*. De multis cerealibus fieri potest, sed optimum, quod ex *Tritico* quinquies aquâ madefacto fit, quod ubi emolliri cœperit, inquit *Dioscorides*, sensim aqua affundenda sine additione, ne, quod utile est, unà effluat. Ubi mollissimum fuerit, effusâ aquâ pedibus calcari ac constringi debet; deindè aliâ aquâ superfusâ denuò calcari: tum enatantes ibi
Fut-

Furfures Cribro excipiendi ; reliquumque quallo sportisque ficcatum è velligio novis tegulis torreatur in Sole, & fervetur.

Anacardus fructus est cujusdam Arboris, cui Græci nomen indiderunt, à Cordis tum similitudine, tum colore. In eo liquor residet mellis crassitie, instar sanguinis rubicundus, gustu adurente; in medio nucleus est exiguæ Amygdalæ effigie : præferuntur *Anacardia* pleniora, & habiliora, fusca, resina in cortice multa acri nigra, nucleo intus albo. Magna ejus est copia in *Malabar* & reliquis *Indiæ* Provinciis.

Anime, aliud ex *Orientali India*, aliud ex *nova Hispania Indiæ Occidentalis* adfertur. 1. *Anime Orientale* est *Gummi*, quod ex *Orientali India Lusitanorum* navibus in *Europam* adfertur, estque trium generum, primum fulvescit & pellucidum est, planèque nobilius, succinum crudum emulatur. Alterum genus nigricat, & ferè simile est *Taurino* glutini, sive illi resinæ, quam officinæ *Colophoniam* vocant. Tertium genus pallidum est, & resinaceum retorridumque. Omnia verò jucundum in suffumigiis spirant odorem, idemque videntur temperamentum sortita : postèriora tamen duo degustata, magis ficare & amarescere deprehenduntur. 2. *Anime novæ Hispaniæ* est Arboris mediocris magnitudinis *Copalliferæ* vocatæ, *Lacryma*, seu *Resina* per incisionem *Thuris* aut *Masticis* modo collecta, alba ad *Thuris* colorem nonnihil vergens. Defertur granis *Thuris*,
fed

sed crassioribus, quæ contracta luteum colorem ostendunt instar resinæ: gratissimi ac suavissimi est odoris, & prunis imposita facilè consumitur. Differt ab *Anime Orientali*, quod nequè tam candidum nequè tam lucidum sit.

Aspalathus, frutex est succulosus, variis horrescens spinis, nascitur in *Ithro*, *Nisyro* *Syria* *Rhodiorum insula*. Optimus est gravis & ponderosus, detracto Cortice rubescens, aut in purpuram vergens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & aliud genus candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Pro *Aspalatho*, si desit, succedaneum erit semen *Agnicasti*, aut *Lignum Aloës*, aut *Santalum Citrinum*.

Asa dulcis, *Assa dulcis*, officinarum, est *Benzoinum* seu *Cyrenacci Laserpitii Lacryma*. Probatur *Benzoinum*, sincerum & translucens colore rubescens, *Electre* simile, gustu gratum, durum, albis distinctum unguibus, aut glebulis, odore admodum blando, *Xyloës*, odorem referente præditum, fuscum autem & impurum improbatur.

Asa foetida, *Assa foetida*, ex *Media* & *Syria* defertur, foetidi virosique odoris *Sagapenum* redolentis. Melior est quæ vergit ad rubedinem, splendens, *Myrrham*, non porrum, referens, & quæ facilè dissolvitur in album colorem. Adulteratur antequàm siccetur cum *Serapino* & *Farina Fabarum*, sed dignoscitur facilè adultera-

160 P H A R M A C O P O E Æ
ta, sapore, odore & calore.

Auripigmentum, metallica res est aurum colore imitans. Ejus apud *Dioscoridem* duo sunt genera: unum è multis *Squammis*, ut altera alteri imposita videatur, constat, id si purum fuerit, nec ulli materiæ permixtum optimum existimatur. Alterum colore *Sandaruchæ*, hoc est rubrum glandis effigie. Deligendum ergò aureo colore micans, è tenuibus *Squammis* compactum, quod facilè funditur, & lapillis aut terræ permixtum non est.

Balsamifera Arbor, seu *Arbor Balsami Indici*. Arborem hanc *Pannucini Chucte* vocant, nostri *Indici Balsami* Arborem, *Mexicenses Boitziloxiel*, seu affluentem resinam nuncupare consueverunt, quia liquorem effundit *Syriaco Balsamo* simillimum, neque odore aut viribus inferiorem. Arbor est *Mali Medicæ* magnitudine, foliis *Amygdali* majoribus, tamen rotundioribus, & magis acuminatis. Floribus in extremis ramorum flagellis luteis, initio loculorum oblongorum forma, sed procedente tempore quorundam veluti foliorum, cæteris longiorum & latiorum, in quorum extremitatis cavitate, Semina inclusa continentur, candicantia, & in quemdam pallorem inclinantia, oblonga, & paulisper contorta, seminibus *Mali Medicæ* similia. Inciso ergò quovis anni tempore hujus Arboris cortice stipiteve, sed præcipuè exactis jam, atque desinentibus imbribus, *Liquor* ille nobilis toto orbe celebr

leber, necdum satis laudatus stillat, quem *Balsamum* appellant è fulvo in nigrum inclinans colorem, sapore acri, paulisper amaro, odore vehementi, sed tamen gratissimo.

Bdellium, densata lacryma est ex arbo-
re *Saracenica* quadam *Ceraso* simili cortice
vestita emanans, atque circà ramulos in
magnos grumos concrescens, qui tam in-
tegrum quàm confracti ex *Arabia*, *India*, &
vicinis aliquot locis adferuntur, unà cum
adhærente sæpè cortice & ramulis. Hoc
Myrrhæ concretionem & adspectum simile:
quare censuit quidam *Bdellium Myrrhæ*
speciem esse (quidam *Anime* esse voluit)
à qua differt non solum quod arbores sint
differentes, sed & in eò quod *Myrrha* sit
fragilior, & in igne, ut *Resina*, ardeat:
at *Bdellium* magis naturam *Gummatis* re-
sipit, difficilè enim ardet, & humore mol-
lescit, odor non sine gravitate suavis. Pro-
batur gustu amarum, translucidum, intus
pingue, liquefcens facilè, & si digitis subi-
gitur, mollescit, ligni ac sordis expers,
fuffitu odoratum, & albis maculis, ungui
humano simillimis refertum, improbatur
nigrum sordidum uberioribus glebulis in
offas convolutum: adulteratur *Gummi* &
Cera; sed fraus gustu & odore innotescit,
quia non ità amarum nec odorem est.

Bezoar Lapis Orientalis, ex quo Ani-
mali proveniat diversi Authores diversa
scripsere, & præcipua pars tenet quod sit
Animal Persiæ ac India Orientalis partim

Cervo simile, partim *Capræ*: hinc fit ut aliis *Capra* audiat, aliis *Hircus*, aliis *Capri-Cerva*: v. g. dicitur *Capra Indica*, *Amato*; *Capra Montana Menardo*, *Capra silvestris Lacunæ*: *Paxon Persis*.

Bezoar Lapis Orientalis, qui est *Lapis* in dicto Animali repertus (ac potissimum in proventriculo, hinc & in ventriculo, aliisque cavitatibus internis) figurâ scilicet variante, ovali, rotundâ, sessili & intus cava (meditullio paleam pilos vel simile continente) superficie levi & splendente: substantiâ è laminis instar Cæparum sese incumbentibus compactâ: variante item colore (plerumque atrovirente, hinc dilutiùs virente pallescente, cineritio, fulvescente, melleo, &c.) odore nullo; variante magnitudine & pondere, plerisque scilicet infra *Juglandis* magnitudinem constitutis, nonnumquàm & paulò majoribus.

Nota. Dantur & adulterati, seu falsi confecti, scilicet ex *Lapidum* fragmentis & pice artificiosè coaugmentatis. Item ex cretâ, cineribus *Testarum*, *Sanguine sicco*, & *Lapidibus Bezoar* minoribus pulverificatis, & cum *Liquore* incorporatis: item ex *Cinnabari*, *Antimonio*, *Mercurio* ignis artificio compactis, tinctis, &c. qui sanè non modò citrà utilitatem, sed & cum detrimento in usum accersuntur.

Notæ ergò bonitatis ab Authoribus passim notatæ sunt.

1. Forma à formâ renum aut Ovi colum-

lumbini exterius levigati diversa, utpotè quæ signum Lapidis adulterati.

2. Structura Laminis multis instar Cæparum sese invicem incumbentibus, iisque singulis glabris, levibus, splendore coruscantibus, quod tamen alii reprobant.

3. Cavitas (Meditullium) expers rei Heterogeneæ præter pulverem, quidam malunt inclusam Paleam, Festucam, Granum, & similia.

4. Pondus aliis leviùs, nonnullis graviùs.

5. Commistio cum Calce, verbi gratia, si Lapis humectatus & Calci vel muro affrictus, Calcem colore viridi tingat: si Lapis Calce vivâ (cui admistâ aquâ) inunctus paulò post flavescat: si Lapis chartæ cretâ oblitæ affrictus viridem inducat lineam: Si pulvis cum Calce vivâ mixtus Colorem ex pallido virentem referat, quod tamen non de omnibus verum esse potest.

6. Friabilitas & dissolutio in aquâ, quæ tamen itidem & falsi Lapidis propria esse non nequit.

7. Liquatio, verbi gratiâ, si acus candens intrudi possit.

8. Disparitas fragmentorum cum gypso aut terra cocta (in duritie scilicet.)

9. Experimentum.

Verùm enim verò, summa in dijudicatione Lapidis cautio adhibenda est, neque absque notarum syndrome de bonitate aliquid certi statuere expedit, præstantissimus

164 P H A R M A C O P O E A
inter cæteros habetur *Perficus*.

Bezoar Lapis, provenit ex Animali *Perruano*, *Capri-Cervo Orientali* simili, cornibus tamen orbo, depascente herbas salutiferas. *Lapis Bezoar Occidentalis*, qui est *Lapis* locis iisdem Animalis, ut de priori dictum, circà rem heterogeniam in cavitate media contentam tunicatim concretus, *Orientalibus* ut plurimum major, superficie scabra, colore cinericeo albo, nigro, obscurevè virente, qui optimus. Præstantiores habentur (uti & *Orientalis*) ex Animalibus montanis exempti.

Bitumen Judaicum cæteris anteponitur. Eligitur fusco colore, splendidum, ponderosum, ac validum odorem vibrans, dum aquis innatat molle; cùm siccatum est, Pice siccâ duriùs efficitur. Nigrum autem, & sordidum vitiosum est. Adulteratur Pice, quod color niger indicat & Picis odor.

Camphora, *Capur*, & *Casur Arabibus* dicta in Burneo optima est, est autem arbor (quam *Garcias* & *Clusius* se vidiisse scribunt) magna instar *Salicis*, è cujus *Medicamento* hæc Lacryma extrahitur, quæ per se coagulatur. Lignum hujus arboris est album & leve. Melior *Camphora* est candida: perlucens, pura, friabilis, tenuis & valdè odorata: Crassa verò, fusca, nigra, assulis ligni sui implicata improbatur: panis calido imposita si madescat, sincera est; si arescat spuria. Si interdum rubentibus, aut nigricantibus maculis conspersa videatur,

tur, id ex sordidarum manuum contrectatione, aut ex madore fieri dicunt; sed facile id emendatur, si in Panno lineo colligatur, in calidam aquam dimittatur, addito *Sapone* & *Limonum* succo; deinde probè elota in umbra siccetur: sic candida redditur. Asservatur semine *Lini*, aut *Milij*, aut *Psylj*, aut *Pipere* sepulta, ne aëri exposita evanescat.

Carneolus Lapis, *Sardius*, vel *Sardinus* *Plinio* dicitur, similitudine à *Sardis Sale* conditis desumptâ, quod eorum colorem repræsentet, vel quod loturæ carnis similis sit: quâ ratione *Gemmarii* illum *Carneolum*, vel *Corneolum* appellant. Laudatissimus circà *Sardiniam* reperitur, & qui purissimâ juxtâ, & nitidissimâ consistit substantiâ, Colore carneo & translucido.

Cassia solutiva. Arbor (unde colligitur) est procera instar *Juglandis*, folia habens ei valdè similia. Ligni materies valdè compacta. Fructus *Siliquæ* sunt longæ, rotundæ, nigræ, intùs medullâ multâ, nigrâ & multis seminibus rotundis, & planis, quæ à se invicem Membranis ligneis ac transversis dividuntur prægnantes. Eligenda est quæ ex *Memphi* & *Alexandria* *Ægypti* convehitur, non admodùm crassa, pelucens, recens, gravis, fracta, & quæ concussa Seminibus minimè constrepit. Utendi tantum tempore extrahenda: nam extrâ Cannas promptè corrumpitur, & in vasis servata pejor evadit. Advehi cepit & ex *Brasilia* *Crassia purgatrix*, cujus uncia

una plus purgat, quam unciae duæ *Cassia* illius *Ægyptiacæ*.

Cassia Græcorum, ut ex Dioscoride & Galeno colligere licet, *Cinnamomum* sive *Canella* Officinarum videtur, quâ pro *Cassia Aromatica* uti possimus. Præfertur rufescens, longa, gustu cum acrimoniâ grato, odore optimo & suavissimo.

Castoreum Medici vocant *Fibri* seu *Castoris testes*. Est autem *Fiber*, seu *Castor* Animal amphibium, ex albo cinereum in dorso nigricans, quod partim in aquâ, partim in terrâ victitat, & ex utroque pabulum venatur, *Lutrarum* modò, quibus valdè simile est caudâ exceptâ, quæ *Castori* glabra est, & lata, & Piscium modò squammosa, *Lutris* longa, rotunda, hispida rufa, & ad castaneam accedens, ut & totum corpus. *Castoris Testes* eligi debent, qui ex uno ortu connexi sunt, liquore intùs veluti cereo, odore gravi, & virus redolente, gustu acri, ac mordente, friabiles, naturalibus tunicis circumdati. Diligenter animadvertendum est ne ab impostoribus factitii *Castoris Testes* emanent: pauci namque habentur, qui adulterio careant, cujus manifestum est indicium nimia eorum magnitudo, cùm legitimi parvi admodùm sint.

Chalcitis metallica res est, in venis *Ærariis* nata, præfertur *Æri* similis, friabilis, nec lapidosa, nec inveterata incursantibus oblongis Venis splendentibusque, promptissimè liquefscens : usta melior est
quàm

quàm non uſta , & quæ urendo cineritia evaſerit , modus urendi in *Dioſcoride* eſt l. 5. cap. 75.

China , *Chinæa radix* , *China Radix* , alia eſt *Orientalis*. Ex Regione *Sinarum* *China* dicta. *Occidentalis* ex *Hiſpaniâ novâ* & *Peru*. Præfertur *Orientalis* , quæ exterius eſt colore rubente aut ſubnigro , interiùs candicante aut ſubrubente : & hæc quò nigrior , eò melior. *Occidentalis* colore eſt interiùs magis ruſo. Optima eſt recens pondere præſtans , ſolida ſucculenta , non carioſa aut ſapore inſipida.

Corallium , ab effigie , & natali loco ſæpè nec impropriè *Lithodendron* ; quaſi *Lapid-arbor* , & aliquandò *Frutex marinus* dicitur : nam ut ait *Macer* , hoc velut arbusti ramuſculus eſſe videtur in *Tyrrheno* ſiquidem , & *Siculo* mari provenit & *fruticis* inſtar aſſurgit , ac ramos emittit. Hinc à nonnullis inter *Frutices* , ab aliis inter *Lapides* , à quibuſdam inter *Bitumina* reponitur. Verè tamen nihil iſtorum eſt. Sed inter omnia ambigit. Triplici autem agnoſcitur diſcrimine , ſi quidem rubrum , aliud album , & tertium nigrum , priùs ut aſpectu jucundius , ſic melius , medicatius , & ad armillas aliaque ornamenta aptius. Album ut ſpongioſius , ſic levius magiſque refrigerans. Nigrum rariùs viſitur , minusque medicatum & expetitur. Laudatiſſimum rubeum , quod ſemper uſurpatur , cum abſolutè *Corallium* ponitur. Aliud inſuper datur mixtum , intermixtis nempe

168 P H A R M A C O P O E A
coloribus intercurfantibus , estque minus bonum. Rubeum ut cæteris præstet , debet esse colore floridum , ut *Alga* odoratum , ut *Frutex* ramosum , fractu facillimum , non scabrosum , lapideum , nec rursus inane aut concavum. Idem de albo intelligendum.

Costus præcellit solidus , optimè plenus , cortice cinereo sivè pallefcente , intus candicans , interdum colore buxi , odore admodum fragrans , irinum videlicet , sivè violaceum spirans odorem , à teredinibus non erosus , gustu acuto , ac linguam vellicante. Omnes ferè optimi *Costi* notæ in *Angelicæ radice* reperiuntur. Hinc ut nonnulli putent , eam pro vero *Costo* substitui posse.

Curcumæ radix laudatur recens , intus *Crocea* , foris *Zinziberi* persimilis ; vehementi amaritudine & acrimoniâ , dum recens est , caret , ob multam humiditatem : ficcata verò acris est , sed non adeò ut *Zinziber*.

Cyperus nascitur in *Italiâ* , in palustribus , & humecto solo , quin & jam locis cultis. In *Germania* in hortis quibusdam colitur , optimus defertur ad nos ex *Syria* & *Alexandria Ægypti* , in cujus defectu *Italicum* supponunt officinæ. Reperitur verò in officinis *Cyperus* duplex , radice rotundâ & longâ ; 1. *Cyperus* rotundus fortè à radicis effigie , quæ pixidulam , aut poculum vasculumve pusillum imitatur , dictus videtur , hic præfertur ad usum Medicum , qui si
desit

desit longus *Cyperus* substituitur. *Dioscoridi* est optima radix gravissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimoniâ jucundi. 2. *Cyperus longus*. Volunt quidam quod hic *Cyperus longis* Radicibus discriminis gratiâ vocetur *Cyperis*. Qui verò rotundis est radicibus, *Cyperus*.

Dictamnium legitimum ac probatissimum in *Cretâ* Insulâ tantùm gignitur. Alia verò planta *Dictamnium album*, vocata *Fraxinella*, planè à *Dictamno Cretensi* diversa, quæ quamvis valde efficax sit, *Dictamno Cretensi* substitui tamen non potest.

Elaterium; est succus *Cucumeris Asinini* condensatus; optimum censetur leve, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodque lucernarum luminibus obiectum faciliè flagret, porraceum autem scabrumque si turbidum spectetur, atque erui Cinerisque plenum sit ac grave, vitiosum statuitur. A *Theophrasto* statuitur *Elaterium* Medicamentorum omnium diuturnissimum, optimumque quod vetustissimum.

Elemni, resina est *Cedri* aut *Oleæ Æthiopice*, eligatur ex *Citrino* pallescens, perquam odora, pura, & à pulverum admixtione immunis. Adulteratur resinâ; sed fraus odore fit manifesta.

Euphorbium Succus est acerrimus, ex Arbore *Lybicâ* ferulæ speciem habente emanans. Eligendum est translucens & acre, adulteratur *Sarcocollæ* & *Glutinis* mistio-

miffione. Sed difficile quidem experimentum, quippè cum levi gustu os accensum diù detineat, adeò ut quidquid ori objiciatur, planè *Euphorbium* refipiat.

Galanga veteribus *Græcis* ignota, & *Arabibus* non satis perspecta, habetur duplex: major & minor; 1. *Galanga* minor *Cyperus Babylonica* ex *Chinarum* Regione in *Indiam*, & indè in *Lusitaniam* deferitur, undè *Chinensis Galanga* dici potest. Optima est quæ fuerit gravis, saturatè rufa, odorata & gustu acerrima. 2. *Galanga* major, tametsi longè crassior radix sit, ignavior tamen est, & viribus infirmior, colore etiam dilutior, minusque odorata, foris subruffa, intùs *Zinziberis* palliditate prædita, gustu acerrima sinè aromaticâ aliqua gratia; hâc in nulla confectiōe utendum est.

Galbanum est Succus nascentis in *Syriâ Ferulæ*, seu *Liquor Grumis* flavis aut candicantibus compactus, substantiâ molli, pingui digitis adhærente, sapore amariusculo, odore gravi. Eligendum purum, pingue cum accenditur flammam nutriendum, mediocriter viscosum, colore flavum tale cùm recens est *Dioscoridi* maximè laudatur *Cartilaginosum* (vel ut alii vertunt granulis refertum) *Thuris* effigiem præbens, pingue minimè lignosum, retinens nonnihil adjecti seminis, & *Ferulæ*, gravi odore, nequè valdè humidum, nequè nimis aridum.

Granatus est gemma pellucida, ex flavedine

vedine rubens, ignis instar, *Minique nativi*, vel factitii colorem ferè referens. Sunt *Granati* alii *Orientales*, alii *Occidentales*, *Orientales* uti meliores, ita & pretiosiores; proindè Provinciam officinalem solis *Occidentalibus* relinquunt.

Hæmatites Lapis, *Lapis sanguinarius* (quod fractus sanguinem imitetur, vel quod sanguinem sistat) foditur non modò in *Ægypto*, sed & in pluribus *Germaniæ* & *Bohemiæ* montibus, præsertim in *Hercynia* sylva, & in ferri-fodinis quibusdam. Commendatur friabilis, saturo colore niger, durus, & suapte ingenio æqualis, nullâ sorde admistâ, nulloque *Zonarum* discursu.

Hermodactylus, radix est officinis nota, probatur candidus, corpulentus, plenus, gravis; non cariosus, qui leni contusione in pulverem *Farinæ triticeæ* similem faciliè redigitur, sapore suavi & dulci.

Hyacinthus est gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignisque flammam imitans. Sunt alii *Orientales*, alii *Europæi*. Hi inveniuntur ad *Iseram fluvium* in confinibus *Silesiæ* & *Bohemiæ*, suntque *Orientalibus* ignobiliores. Quoad colorem, referunt alii colorem *Minij nativi*, aut sanguinis admodum biliosi; & hi sunt præstantissimi: alii rubedine *Croci* flavescunt; alii exactè ostendunt succini colorem, & hi viliores, alii albi pellucidi succini colorem referunt; & hi omnium vilissimi habentur.

Hypocistis copiosè ad *Cisti maris Radices* nasci-

nascitur, quæ summis cespitibus diffunduntur, & cohærent novo nempè vere cum cistus jam ad explicandos flores se parat; nam quando primùm emergit, purpureo apparet colore, deinde paulatim assurgens & sese explicans, multum pristini coloris remittit, & cytinus suos profert candicantes turgidos, & lento succo plenos, qui etiam *Hypocistis* appellatur. Nascitur in pluribus *Etruriæ* asperis locis, montibus potissimum *Lucensibus*, *Apenino* quoque monte, itemque in *Hispania*, *Lusitania*, & *Gallia Narbonensi*.

Falappa incognita fuit veteribus. Veram autem historiam *Falappæ* exponit Gregorius Horstius libro tertio Epistolarum Medicin. Est autem nihil aliud docente Clossæo, quàm mirabilis *Peruviana*, cujus radix inodora in diebus Canicularibus effoditur, tesseratim inciditur, inque loco umbroso siccatur.

Kinkinna, *Kinakina*. Arbor ex nova, quæ *Orientem* spectat, *Peruvia*, vocatur ab incolis *Gannanaperide*, ab *Hispanis* *Palo de calenturas*, id est *Lignum Febrium*: ejus cortex inter orbis *Americani* divitias notissimus ad nos devehitur crassitie mediocris, substantiâ tenuis, foris scaber, passimque exili canescens musco, intus lævis, colore ferrugineus, qualis est *Cinnamonomi*, amarus, & terræ quâdam admixtâ portione austerus. Adfertur ex *Peruviano* Regno, cortex dictus *China Febris*.

Lacca

Lacca, Gummi quoddam est, quod ex *India* mauritani petunt, eoque etiam in suis compositionibus utuntur, ut in *Dialacca*. Melior est quæ sincera est, lignique fragmentorum expers, & quamvis prædura exsuccaque sit, præmansatamen spiritum efficit sanguineum, quod probitatis est indicium.

Ladanum, Liquor est ex *Cisti*, *Ledon* appellati, foliis exsudans. Optimum, minimèque adulteratum, odoratum esse debet, subviride, facilè mollescens, pingue, resinofum, arenularum aliarumque sortium expers, quale in *Cypro* gignitur.

Lapis Armenius, est similis *Lapidi Lazuli*. Præfertur, qui est maximè viridis, communicato colore cum cæruleo, lævis, perquam æquabilis, tactuque friabilis. Ejus loco *Lapis Lazuli* usurpari poterit.

Lapis Judaicus. In *Judea* nascitur *Glandis* effigie, candidus, scitâ admodum configuratione, lineis æqualiter inter se distantibus, quasi industriâ deornatis. Passim in officinis habetur.

Lapis Lazuli, apud *Arabes* is est, quem *Cyanæum Græci* nominant, effoditur in *Orientalibus* aurifodinis. Præstat, qui similis est sereno cælo, maculas quasdam aureas, stellarum modò radiantes habens, & aliorum Lapillorum mixturæ expers. Duplex habetur: *Orientalis*, & qui ex *Germania* adfertur; *Orientalis* ex eo cognoscitur, quod in igne colorem non amittat, sed illustrior reddatur; *Germanicus* verò hebe-

hebetatur, & de colore remittit.

Lapis Nephriticus, in Nephritico dolore maximè laudatus, ex *nova Hispania* deferitur. Variegatus est & *Præssio* similis, ad viridem colorem lacteo permixtum tendit; præfertur viridior.

Lapis Pyrites, vulgò *Marchasita*, gignitur autem *Marchasita* (ut rei metallicæ periti tradunt) ex impuro Metallorum halitu : quo fit ut ferè semper reperiatur in montium cacuminibus, præfertur qui ænei coloris est.

Lignum Guajacum, *Hagioxydon*, *Lignum sanctum*, *Lignum Indicum*, est primum celebratissimorum illorum simplicium, quæ ex *Occidentali india* deferuntur. Sunt verò *Guajaci* genera tria, primum deferitur ex *Insula sancti Dominici*, secundum ex *Insula S. Joannis de Portu divite*, quod postea repertum superiori ferè simile, sed per omnia minùs, & penè sine matrice, superiore tamen odoratius & amarius, quod illi præponitur, & ob mirandas facultates *Lignum sanctum* dicitur. Multæ sunt *Insulæ* in Oceano, in quibus *Guajacum* nascitur, ut *S. Benedicti*, *Hispaniola*, *S. Crucis*, *S. Dominici*, *S. Joannis de Portu* : egregium tamen in *Insulâ S. Joannis* oriri existimatur : sed cum hoc Ligno naves onustæ, in *Hispaniam*, *Genuam*, *Venetias* afferantur, nec ratione loci dignosci possit, ex ipsius dotibus eligendum, quod ponderosum est, corticem adhærentem habet, gravem odorem obtinet, & aquam, in qua

co-

coquitur, facilè tingit. Tertium genus in *Orientalibus* reperitur. *Lignum Guajacum*, nonnulli ad *Buxi* speciem, alii ad *Ebeni Dioscoridis* alteram speciem non quidem malè retulerunt, alii novum arboris genus esse censuerunt: grave est hoc lignum ut in aquis statim subsideat, non fluitet. Cortex ejus æquè atque Lignum in usum venit, quem nonnumquàm *Fraxini cortice* adulterari contingit, aut similibus, qui tamen dignoscuntur sapore, & odore quodam peculiari.

Lignum Nephriticum, ex nova Hispania mittitur, quod cinereum est, crassum, enode, & exiguo spatio aquæ injectum, eam cæruleo colore tingit, qui sensim intenditur pro temporis diuturnitate, cæruleum ideò dictum, quoniam adulteratur alio ligno simili, quod aquam croceo colore inficit, ne quis fallatur.

Malobatrum, est folium *Indicum*, *Nardo* *Indico* odore & sapore simillimum, sed *Nardo* efficacius. Laudatur recens ex candido nigricans, fractu contumax, integrum, & odore vegeto nares feriens. Est autem *Malobatrum* Folium sui generis. quod *Indicæ* gignunt paludes, *Lentis palustris* modo innatans aquis sine radice, id ipsum collectum statim lino trajicitur, siccatumque reconditur. In ejus locum *Mauri* invexerunt folium *Lauro* proximum, sed majus, & nervis tribus folium intercurrentibus distinctum odore jucundo. Ejus succedaneum est *Spica* tam *Indica* quam

Cel-

Celtica, vel *Cassialigna* vera, aut potius cortex externus *Citri* siccatus.

Manna, est veluti ros cælestis dulcis & gratus, qui ex aëre sudoris instar exudans, sub lucanis horis super frondes & ramos arborum, herbarumque delabitur, & brevi *Gammi* modò concrescit. Præfertur *Calabrina*, & in primis quæ stirpium frondibus insidens colligitur, proinde *Foliorum Manna* cognominata, minutis granulis similis, candida, gustu dulcis, recens atque suavis. Secundas partes sibi adsciscit, quæ ramis insidet; tertias verò, quæ lapidibus & solo inhæret, nimirum hæc granulis constat crassioribus, & colore longè minus sincero.

Manna Thuris, sunt minutissimæ *Thuris* micæ. Laudatur alba, pura, micarumque frequentia prædita. Sunt qui cribratâ *Pini* resinâ ac polline, aut cortice *Thuris* contusi adulterant, sed hoc igne depræhenditur: nam adulterata non æqualiter incensa flagrat, sed fuliginosum & impurum vaporem expuit, variumque odorem habet.

Margaritæ, ex Conchis quibusdam, seu Piscibus testaceis, *Ostreorum* valdè similibus in *Indico mari* victitantibus sumuntur, quæ si parvæ fuerint, *Margaritarum* nomen servant; si crassæ & ponderosæ, *Uniones* appellantur. Præferuntur *Orientalis* candidissimæ lucidissimæque: Persicæ & perforatæ improbantur.

Marum, herba est non dissimilis *Majora-*
ranæ

rana, cujus loco accipitur *Dictamnus Creticus*, vel *Majorana*.

Mastiche, resina *Lentiscina*, *Mastix*. Est resina quæ *Lentisci* trunco vulnerato, primum liquida distillat, dein paulatim in guttas densatur, foris candida aut flavescentis propter inherentem Pulverem, quò absterfo, propemodum Crystallina & translucens. *Lentiscus Mastiche* eruëtaus, est arbor admodum procera; non tantum in *Chio* & *Ægypto*, sed & in certis locis *Italiae*, ut in *Apulia* reperitur. Ex ejus ligno *Dentiscalpia* fiunt optima, quibus non modò repurgantur Dentes, sed roborantur, *Gingivæ* constringuntur, & ori suavitas conciliatur. Præfertur resplendescens, & candore *Hetruriæ Cerae* similis, retorrída, crassa, odorata, friabilis, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur *Thuris*, Resinæque *Pineæ Nucis* mixtione.

Mechoacan, *Mechoaca*, *Mechoacana*, *Peruviana Mechoaca*, *Bryonia Mechoacana* (quod radix *Bryoniæ* sit similis, à quatamen multum differt, quod *Bryoniæ* radix viridis & ficca, admodum acris, *Mechoacan* verò insipida & sinè acrimonia) *Mechoacan* radix diligenda est recens, intus albicans, exteriori parte nonnihil cineritia, crassa, compacta, multis circulis distincta, nullius mali saporis particeps, & sine acrimonia. Improbatur valdè candida, nigra, & cariosa. Quæ in *Quito*, & circa *Nacuragua* nata, præstantior est priore.

Mentha folia tenuia sunt angusta, Capillacea; surculi graciles Cubitales, in quorum summitatibus prodeunt umbellæ cum flosculis candidis; radices admodum tenues sunt & odoratæ, quarum in Officinis usus est.

Moschus. Est autem *Moschus*, & excrementi, & Animalis, à quo idipsum habetur nomen. Animal verò exoticum est, idque *Indicum* in Regno *Pegu*, ac potissimum in *Agro Tumbascorum* admodum frequens, *Capræ* non multum diffimile, ac corpore prægrandi *Dorcadem Moschi*, *Gazellam Indicam* & *Capreolum Moschi* nominant.

Huic cum *Veneris* æstro percellitur, furoris vehementiâ *Umbilici Regio* intumescit, ibique congesto Sanguine multo & crasso, fit Apoltema: atque tum ferum illud Animal potum cibumque averfatur omnem, & humi sese prævolvens, atque lapidibus & arborum truncis turgentem partem quâdam voluptate confricans, dirumpit ac vomitam aperit, ex qua sanies quædam excernitur, quæ verus est *Moschus* omnium rerum odoratissimus & suavissimus, quique alias omnes *Moschi* varietates, quæ nunc multæ circumferuntur, bonitate superat.

Illa autem sanies, super arborum truncis aut saxis relicta, calore Solis, ac Cæli bonitate coquitur, elaboratur, & virosus ipsius odor, si quis sit, dissipatur, fitque præstantissimus ille *Moschus*, quo Reges &

& Magnates donantur & utuntur ; quod verò passim venditur , bonitate longè inferior est , & ab Animalibus venatu captis carpitur. Captâ enim Ferâ , Venatores partem cum corio simul abscindunt , cruorem effluentem exprimunt , colligunt , exsiccant , & servant cum utriculis aut pelibus eorundem Animalium , quorum sæpè Sanguis exsiccat , pauculæ recrementi , dicti portioni commixtus , pro puro *Moscho* ab institoribus seu adulteratoribus venditur. Qui verò suapte naturâ in Animalis utriculo sibi maturitatem comparavit , hic verus & optimus est *Muscus*.

Est quoddam genus *Mustellæ* majoris , quæ quod Martia sit & pugnax (Gallinas enim etiam grandiores enecat) quibusdam *Martes* , aliis *Marturella* , vulgò *Fovina* dicitur , cujus excrementa *Moschum* redolent.

Sunt & quædam plantæ & fructus , qui hujus Aromatis suavitatem naribus & palato referunt , ut *Geranium Moschatum* , herba *Moschata* dictum , *Rosæ Moschata* , & *Pyræ Moschatellina*.

Myrobalani quinque generibus distinguuntur , videlicet in *Citrinas* , *Chebulas* , *Embllicas* , *Indas* & *Bellericas*. *Citrinæ* laudantur multum flavæ , in viride inclinantes , densæ , graves , gummosæ , cortice crasso os parvum complectente. *Chebula* quò majores , eò meliores , nigrae in rubrum inclinantes graves , quæ aquæ impositæ statim merguntur , cortice crasso. *Indæ* optimæ sunt

nigræ, substantiâ solidâ, si frangantur densæ, magnæ, graves sine offibus. *Emblicæ* sunt magnæ, graves, densæ, carne multâ, offibus exiguis. *Bellericæ* verò, densæ, magnæ, graves & cortice crasso, quæ his notis carent, aut vetustate exoletæ, aut aliud incommodum passæ sunt.

Myrrha, *Arabica* arboris lachryma est. Laudatur quæ subviridis est, pinguis, splendens, resinosa, mordens, foris undique concolor; si frangatur, venas quasdam unguium modo candidas intus habens: talisque eligenda, quæ recens sit, fragilis, lævis, amara insuper & odorata. Inutilis est nigra, aut piceo colore, gravis, re-torrída & pinguedine carens.

Nardus, officinæ *nardi spicam* appellant, cujus duo sunt genera: unum *Indicum*, alterum *Celticum*. *Indicum* perquam odoratum sit, recens & læve; haudquam pulverulentum, *Cyperum* redolens, brevi spicâ, amaro sapore linguam siccante, quod diù in sua odoris gratia permaneat. *Celticum* verò in *Liguria alpibus* nascitur: laudatur maximè recens, jucundi odoris, radice numerosâ cohærens, plenum & non fragile. *Nardum rusticam Lavendulam* vocamus.

Opium Succus est è capitibus *Papaveris nigri*. Trium est generum: unum ex capitibus & foliis expressum, *Græcis Meconium* vocatur, quod ignavius: alterum lachryma est ex capitibus paululum incisfis exstillans, quæ verum est *Opium*. Optimum est densum,

densum, grave, amarum, odoratu soporiferum, quod facillè *Aceto* dissolvitur, lene candidum, neque asperum, neque grumosum, quod colatum non statim, uti *Cera*, coëat, quod in Sole diffundatur, & admotum *Lucernis* clarâ non atrâ luceat flammâ, & extinctum odoris vim conservet. Adulteratur *Glaucio*, hoc est *Menthæ* aut Gummi, aut silvestris *Lactucæ* succo. Verùm *Glaucio* fucatum in dilutione, *Croci* colorem reddit: *Lactucâ* depravatum inodorum est, & asperius: Gummi vitiatum, infirmum est & splendescit.

Opoponax, Succus est effluens ex incisa radice, aut caule *Panacis*, quod *Dioscoridi* *Heracleum* dicitur. Commendatur quàm amarissimus, interné albus aut subfulvus, foris colore croceo, lenis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent & gravi odore. Niger improbatur ac mollis, nec non Ammoniaco aut cerâ adulteratus; sed sinceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resolvatur, & lactescat.

Rhabarbarum, in interiore *Sinarum* Regione provenit; undè in Urbem *Canton* (Nobilissimum totius Provinciæ Emporium) exportatur, & indè navibus in *Indiam* advehitur. Optimum est si odore nares feriat, compactam simul habeat substantiam, aureo sit colore, aureisque ac rufis Venulis abundè distinctum, gustu amarum, grave pro lævitate sua, & quod madefactum croceo colore manum fricantis tingat. Conservatur per annos tres aut

quatuor integrum incorruptumque, si cerâ solâ, vel Cerâ cum *Terebinthina liquata* circumlinatur, aut *Melle albo*, aut *Psyllio*, aut *Milio* mergatur.

Rhaponticum, ex *Septentrionali* plaga advehitur, optimum habetur quod teredines non habet, gustuque subacri cum remissa astrictione lentescit: ejus radix nigra est, *Costo nigro* foris, *Centaurio magno* intus similis, sed minor, & magis rufa, fungosa & laxa, aliquantulum lenis, sine odore, quæ mansa colorem reddit pallidum ad *Crocum* inclinantem, fragilis & amara.

Rubinarum multa sunt genera, sed nobilior ille *Rubinus* vocatur, cujus nitor vivacior sit cæteris, & rubore sit splendens & elegans: à rubore non sine ratione appellatus est *Rubinus*, optimus in Flumine *Pegu* reperitur, durus & frigidissimus.

Sagapenum, quod officinis *Serapinum* dicitur, est succus *Ferulaceæ* herbæ in *Media* nascentis. Laudatur translucens, fulvo forinfecus colore, intus albedo, & quid inter *Laser* & *Galbanum* redolens, gustu acri, substantiâ crassâ, & facilè in aqua resolubile, quod his caret notis, adulteratum & spurium censetur.

Sandaracha, Lapis est in Metallicis venis, plerumque cum Auripigmento nascens: ideò *Serapioni* Auripigmentum rubrum dicitur: rufa est nonnihil ad luteum vergens, quæque cum uritur fumum emit tit pallidum, Sulphurisque virus redolet
etfi

etsi non consumatur. Animadvertendum est, quod *Sandaracha* non sit vernix scriptoria, ut aliqui putant; si quidem nihil aliud hæc est, quàm *Gummi Juniperi*, quod à *Mauritanis Sandarax* dicitur.

Santalum, est triplex, pallidum, album & rubrum, quæ genera non nascuntur in una Provincia, sed magna est locorum distantia. Pallidum, quod & Actuarius dicitur *Santalum Citrinum*, *Santalum luteum*, *Aromaticum*, *odoriferum* aliis præfertur; quia odoratius. Nùm verò id habeamus, valdè dubitandum, quandoquidem scribit Garcias ab horto vix in *Lusitaniam* deferri, quoniam ejus pretium majus sit apud ipsos *Indos*, quàm apud *Lusitanos*. Fieri igitur poterit, ut aliquod aliud odoratum Lignum, ut *Cedri*, vel alterius arboris, nobis pro legitimo *Santalo*, obtrudatur, cùm & vulgare *Santalum Citrinum* acre sit, quale legitimum non est. In ejus defectu substituendum est, album seu candidum *Santalum*. Rubrum *Santalum* postremum locum obtinet, quod nullo commendetur odore, neque in iis locis nascatur, ubi cætera genera. Hoc decorticatum affertur, & *Ligno Brasiliano* dicto sæpe adulteratur; verùm licet utrumque sit inodorum, attamen *Santalum* neque dulce est, neque inficere debet. *Brasilianum* & dulce est, & inficit; ponderosior, quin etiam & solidior hujus materia, ideòque aquæ injectum statim fundum petit. Nostrium *Santalum* rubrum dulce est, & inficit; quare fortè

184 P H A R M A C O P O E A
spurium & adulterinum erit dicendum.

Sapphyrus, est gemma pellucida, constans colore cæruleo five cyaneo, perquam translucido, cælique sereni colorem referens, splendore & perspicuitate summâ; est gemmarum omnium durissima, Adamante excepto: optimus apud *Indos* reperitur.

Sarcocolla, cujusdam arboris peregrinæ, & Gummi ab ipsa manantis Nomen est. Nas citur in *Perfide* fructuosa & spinosa ramis nodosis, & arbori appressis, ex quibus fauciatis, & interdum spontè profluit lacryma *Thuris pollini* similis, colore subrufa, amara sapore citrà morsum, dulcedinem *Glycyrrhizæ* referens. Adulteratur Gummi, sed gustu deprehenditur, adulterata enim amara non est.

Sarsaparilla, planta est multis radicibus nitens, duos cubitos aut ampliùs longis, Colore cinereo dilutior, quæ interdum tam altè demittuntur, ut qui integras erue-re volet, ei profundâ fossione opus sit. Ex *Hispania Nova*, & Provincia *Honduras* transfertur. Matthiolus & Dodonæus putant esse eandem cum *Smilace Nostrate*; Dissident tamen inter se multum, nam *Smilacis asperæ* radix nodosa est, & geniculata, graminis ritu, multòque brevior & mollior. Enodis verò est *Sarsaparillæ* radix, nullis geniculis asperata, dura, fibrosa, rugosa, medullosa, & aliquandò viginti pedes longa, atque Viminis instar facillè finditur. Deligenda est candida ad
pal-

pallorem tendens , recens , non cariosa , sed medullosa , fractu contumax & ponderosa ; nam quæ cariem sensit , & dùm frangitur pulverulenta est , inutilis existimanda.

Sasafras Arbor magna est , folia ferens ficulneis similia , & in tres partes divisa , stipites leves , subrubeos , & sceniculum olentes. Nascitur in Provincia *Florida* & *Mechuanensi* , ejus Lignum optimum est recens , acri sapore præditum , ad cinereum Colorem tendens , atque suum corticem retinens : nam quod cortice caret , vile & invalidum censetur.

Scammonii nomine succus plantæ cujusdam concretus , & planta ipsa intelligitur , quibusdam tamen magis propriè hæc *Scammonia* , ille *Scammonium* dici videtur. Est vero planta lactaria , volvulosa , scanforia , lævis *Smilacis* modo , cui foliis , flore , & facie valdè similis est , sed radice non parùm dissimilis , quæ in *Smilace* tenuis est , in *Scammonio* crassa , prælonga , intùs candida , odore gravis , & multo Succo prægnans , ex eaque tenues & viticulosi furculi prodeunt , qui vicinos frutices conscendunt , amplexantur , & se implicant , folia ei lata & acuminata sunt instar *Arisari* , sed minora. Flores albidii , concavi , Calathi figurâ ; nascitur uberius in pingui solo , præsertim in *Antiochia* & *Syria*. Ex ipsius radice *Scammonium* vulgò dictum , seu liquor colligitur plurimis modis , ut videri poterit ex Rænodeo , Theodoro & Cor-

Corbeio. *Mesue* laudat *Antiochenum*, subalbum, Gummi modò clarum, aut varium, quod fractum salivæ aut aquæ contactu lactescat, fractu facile, læve, odoris non tetri. *Dioscoridi* probatur læve, nitidum, rarum, fungosum, venulis exilibus. Adulteratum quoque aquæ contactu lactescit; sed adulterium vehementi acrimoniâ deprehendi ait.

Schænanthum, id est *flos Junci odorati*, omnibus notum. Eligendum rufum, intenso colore, recens, tenue, rubentibus fragmentis, quod manibus fricatum Rosæ odorem emittit, igneæ Mordacitatis ad Linguam, eligatur floribus refertum, si fieri potest.

Sena duplex habetur, una est acutioribus, angustioribusque foliis, quæ ex *Alexandria*, *Ægypti*, vel ex *Syria Venetia* defertur, & vocatur *Sena Orientalis Alexandrina*, *Syriaca*, *Ægyptia*, *Sena minor*. Altera est latioribus rotundioribusque foliis, & in *Italia* spontè, vel lævi culturâ æstivis tantùm mensibus provenit, undè magna copia deportatur. Hæc vilior est, & *Orientali* longè inefficacior, ità ut hujus uncia tantùm præstet, quàm *Orientalis* Semiuncia. Probatur recens, viridis, probè reficcata, non maculosa, nec teredine exesa, nec stipitum admixtione fraudata. Ejus folliculi foliis præferuntur recenter ficcati, colore è viridi obscuro, & *Senæ* odorem referentes; evanidi namque, feminibus vacui, putidi, ac malè olentes purgatoriâ vi destituuntur.

Smaragdus, quò nihil viridius, tanti splendoris existit, ut oculos intuentium perstringat; translucidus debet esse, nitens, & colore excellens; ejus bonitas cognoscitur, si in os sumptus frigidus sentiat, & Carbonibus injectus non ardeat, nec flammam emittat.

Styrax Calamita Succus est arboris cujusdam *Syriacæ*, qui è *Pamphilia* advehitur intrà calamos, ne quid suavis odoris amittat. Præfertur rufescens, crassa, spinosa, albicantibus grumis plena, odore jucundo atque perseverante dotata. Deterior nigra, fursurosa, situ obducta & inodora; adulteratur ligni ipsius scobe, melle, cerâ, adipe odoribus imbuto, & quibusdam aliis, dignoscitur, quod adulterata invalido sit odore; sincera verò admodum acris sit.

Succini tres præcipuè sunt differentiæ ex colorum varietate: prima lutea est, gratâ perspicuitate transparens, auri colorem repræsentans: altera alba, imò candidissima est, rara, sed optima: tertia obscura, confusos & variè mixtos colores obtinens. Probatur illa, quæ attritu calefacta illicò paleas, aliasque res minutas ad se trahit, fulva ac translucens, & quæ accensa *Bituminis* odorem reddit.

Tacamabaca ex nova Hispania defertur, est Gummi seu resinæ genus collectum è vulnerata arbore magna, instar *Populi*, admodum odorata, cujus fructus est ruber, *Pæoniæ Seminis* modo.

Tamar-

Tamar-Indus arbor est, in qua nascuntur *Tamarindi*, procera, *Costaneæ* au *Fraxini* modò, dura, compacta, multis cincta ramis, & foliis armata minutim incisus palmi magnitudine. Fructus hi immaturi virent, & acidi sunt; maturi subcineritii, eorumque tunc aciditas suavitate non caret. Probantur colore nigro rufescentes, multis villis intertexti, recentes, lenti, pingues, vinosi, jucundâ tamen aciditate grati, nucleos intùs continentes sativorum *Lupinorum* magnitudine, quodammodò rotundos, sed planos, colore fulvos, & leves. Servantur in fictile vitreatum coacti, loco frigido & sicco. Adulterantur *Prunorum* carne, sed in his nigredo est obscura, humidiores sunt, & *Prunorum* odor & sapor illis inest.

The herba, seu *Frutex Chinesi*, *Tsia* verò *Japonibus*, eadem sunt. Foliorum decoctum illis *The*; his *Tsia* itidem dicitur, licet *Chinensium Tsia* ob majorum foliorum macerationem, & coctionem nigrum *The* appelletur. *Japonensium Tsia* ob minimorum in summitate Fruticis foliorum præparationem gratioris utique sit saporis, majorisque efficacix, ac altioris quoque pretii. Omnis *The*, sive *Tsia*, nullibi terrarum (quantùm quidem constat) nisi in *Japoniæ*, *Chinæ* & *Chiam* campis colitur; exsurgitque ad *Ribesiorum*, vel *Rosæ Europææ* molem & altitudinem. Caules & ramusculi totius Fruticis à pede usque ad verticem perpetuis & infinitis floribus & fo-

foliis tenuibus acuminatis, in ambitu crenatis, incisfis & dentatis instar ferræ, ornatè vestiuntur, *Bellidis* aut *Chamæpityos* foliis similibus, ab acetosa silvestri diversis, &c.

Quæ ejusdem licet formæ, diversæ aded sunt magnitudinis, ut quinque differentia foliorum uni, eidemque frutici adnatorum appareant. Prima & maxima in inferioribus ramusculis, *Balsami hortensis* foliis simillima existunt. His succedunt ea, quæ secundæ magnitudinis, & prioribus multò minora sunt, ut sic gradatim ascendencia quinquies manifestè differant.

Verùm quantum hæc folia sursum magnitudine decrescunt, tantum pretio accrescunt. Hæc Guilielmus Piso in annotationibus ad historiam naturalem & medicam *Indiæ Orientalis*, Jacobi Bontii pagina 87. 88. 89. quippè primæ magnitudinis exsiccatarum & præparatarum libra valet quinque asses; secundæ quinquaginta; tertiæ verò quinque florenos, quartæ quindecim; quintæ & ultimæ magnitudinis quinquaginta: imò subindè centum & quinquaginta florenos valet, si ritè præparata fuerint folia.

Flores porrò fert *The* albicantes, magnitudine, figurâ, colore, *Rosæ silvestri Europææ* (quæ *Eglancier* vocatur) excepto odore, simillimos. Quorum foliolis decidentibus, umbilicus manet, ubi semen horum fruticum rotundum, & nigrum continetur *Rosarum* instar, quod terræ com-

commiffum novas producit plantas triennii fpatio. Ex quorum foliis meffis luculenta illis annuatim redit, etiam iis *Japonie* locis, ubi gelu & nix vigent æquè ac in *Hollandia*. Radices funt fibrofæ, & in minimas particulas difperfæ circa terræ fuperficiem, nullius hætenus ufus habitæ: ita ut fola hujus decantatæ plantæ feu fruticis præftantia in frondibus exiftat, quæ VERE *Japonenfi* lectæ & in umbra exficcatæ ad quotidianas decoctiones refervantur. Quantum ad faporem foliorum *The*, præter amaritudinem & calorem, aromaticum quid, & tenuitatem partium prædominantem potiùs, quàm adftrictionem, arguere videntur.

Petrus Borellus hiftoriarum, & obfervationum rariorum Medico-Phyficarum Centuria 3. obfervatione 39. de *Thea* fic inquit: In duabus tantùm *Chinæ* Provinciis arbor *Thea* dicta reperitur, ex Alexandri de Rhodes peregrinationum hiftoria, quæ *Bellidis* folia habet, & in una quàm in alia major eft. Magnis curis colliguntur hæc foliola femel in anno (ut nos hîc in Gallia Uvas colligimus) ex arbore *Myrti* folio prædita. Bulliuntur in aqua, & tunc extendi poffunt, & eorum forma percipi, &c.

Terebinthina vera ex *Terebintino*, feu *Termintho* arbore (ut *Græci* dicunt) habetur. Eft enim liquor pinguis ex ejus trunco & ramis defluens. Optima eft clara, perlucida, alba, acris & odorata. Laudatur quæ

quæ ex *Chio Insula* defertur, *Chia* ob id nuncupata : hæc odore & gustu cæteris antecellit, & plus *Terebinthi* refert. Quæ cum ad nos non advehatur, *Abietina*, quæ ex *Abiete*, aut *Laricea*, quæ ex *Larice* effluit, loco illius substitui possunt.

Terra Lemnia præstantissima habetur, quæ ex *Insula Lemno* defertur, in placentulas efformata, ac aliquo plerumque sigillo obfignata, & ideò sigillata vocatur, rufo plerumque est colore, pinguis adeò, ut è sævo constare videatur, dum in ore contenta linguæ & labiis admovetur.


Thus est arbusculæ cujusdam in *Arabia* nascentis lacryma resinosa. Duo traduntur genera : unum dicitur *Olibanum*, seu *Thus masculinum*, quod ex albo flavescit, limpidum, pellucidum, pingue ac siccum est, resinæ *Cedriæ* puritatem, succinique nitorem emulatur. Alterum *fœmininum*, quod bonitate *masculo* cedit, resinosum magis ac molle, & citò ardens. Adulteratur admisto *Pini* aut *Nucis* ejus cortice; sed horum index ignis est : siquidem reliqui cortices suffiti, nequaquam incenduntur, & sine odore fumum eructant : *Thuris* verò cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem ejaculatur.

Tragacanthæ est lacryma, quæ ex plantæ *Tragacanthæ* radicibus colligitur, & per cribrum aut rarum linteum exprimitur, candida, pellucida, nitida (licet & flavescens subrufa reperiatur) substantia est glutinosa, quæ difficulter teritur, & aquam, quâ

quâ dissolvitur , in densam mucilaginem instar glutinis convertit. Eligenda candidissima , parùm translucens , gracilis , lævis , sincera , subdulcis , & cujus minima portio maximam aquæ copiam coagulat. Quæ est antiquata , primùm pallefcit , deindè rufescit , tandem etiam flavescit , fitque hæc annis amara , ob idque calidior , atque ideò ad confectiões calidas potiùs adhibenda. Adfertur ex *Creta*, *Asia* & *Græcia*. Planta , seu Arbuscula *Tragacantha* , etiam in *Italiæ* quibusdam locis reperitur.

Turbith. Præfertur intùs subalbum , foris cineritium , fractu facilè , recens , & cujus caulis pars radici proxima , gummosa est. Improbatur vetus aut cariosum , quia Viscera conturbat.

Xylobalsamum , Lignum *Balsami* legitimum nondùm in Officinis prostat , quale requirit *Dioscorides* , recens , sarmento tenui , fulvum , odoratum , quadamtenùs *Opobalsamum* spirans. Quod verò pro eo ostenditur *Xylobalsamum* Officinarum , alterius cujusdam arboris virgultum est , & potiùs *Myrthum* quàm *Balsamum* refert. Hinc fortè *Lentisci* (in *Italia* nascitur) Surculi ; modò non cariosi sint , sed recentes , nec odorem amiserint , & exsiccantes , moderatè quin & astringant , & aromatici sint. Alii tamen *Macis* & *Cyper* æquales partes , alii *Santalum* flavum , alii *Cubebas* substituunt.



INDEX

MEDICAMENTORUM

COMPOSITORUM

IN HAC

PHARMACOPOEA

CONTENTORUM.

Aceta.

C Alendulæ.	24
Rosarum rubrarum,	
Sambuci, &c.	<i>ibid.</i>
Acetum Stillatitium,	<i>ibid.</i>
Scylliticum,	<i>ibid.</i>
Theriacale,	25

Antidota & Opiata.

Confectio Alkermes,	71
Diascordium Fracastorii,	<i>ibid.</i>
Confectio Hyacinthorum,	72
Mitridatium,	73
Philonium Romanum,	74
Requies Nicolai,	75
Theriaca Andromachi,	76
N	The-

INDEX MEDICAMENTORUM	
Theriaca Dia-Tessaron,	78
Electuarium è Succo Ruthæ,	<i>ibid.</i>

Aquæ simplices Stillatitiæ, 13

Aqua Mellis,	14
--------------	----

Aquæ Compositæ.

Aqua Anti-Scorbutica,	14
Catharralis,	<i>ibid.</i>
Cinnamomi,	15
Embryonum,	<i>ibid.</i>
Epileptica,	16
Hysterica,	17
Prophylactica,	<i>ibid.</i>
Theriacalis simplex,	18
Vitæ Composita,	<i>ibid.</i>
Vitæ Aulica,	19
Aqua seu Elixir Anti-Febrile,	20
Spiritus Carminativus,	19
Spiritus Aromaticus Oleosus seu Sal Vo-	
latile Oleosum,	20
Spiritus Vini Camphoratus,	21
Rectificatus,	<i>ibid.</i>
Tartarifatus,	144

Spiritus ardentes.

Cochleariæ,	21
Menthæ,	<i>ibid.</i>
Melissæ,	<i>ibid.</i>
Baccarum Sambuci,	<i>ibid.</i>
Juni-	

Cerata.

Ceratum de Crusta panis ,	114
Ceratum Defensivum,	<i>ibid.</i>
Ceratum Matricale,	115
Ceratum Santalinum,	<i>ibid.</i>
Ceratum Stomachicum,	<i>ibid.</i>

Condita. 49

Conserve & Saccharata. 50

Decocta.

Decoctum Hordei ,	26
Cremor Hordei,	<i>ibid.</i>
Hordeatum Amygdalinum,	<i>ibid.</i>
Ptisana Communis,	<i>ibid.</i>
Decoctum Cordiale Medicinæ,	27
Decoctum Solutivum ,	<i>ibid.</i>
Decoctum Pectorale,	<i>ibid.</i>
Decoctum Clysteris emolliens,	28
Decoctum Carminativum,	<i>ibid.</i>
Decoctum Nephriticum,	<i>ibid.</i>
Decoctum Vulnerale ,	29

Electuaria Solutiva.

Benedictum laxativum,	52
Caryocostinum,	53
N 2	Cho-

INDEX MEDICAMENTORUM.

Cholagogum,	53
Dia-Catholicon,	<i>ibid.</i>
Dia-Phœnicon,	54
Hydragogum,	<i>ibid.</i>
E Succo Rosarum,	55
Hyera Picra,	<i>ibid.</i>
Confectio Hamech,	56
Passulæ Corinthiacæ laxativæ,	57

Emplastra.

Album Coctum,	116
De Baccis Lauri,	<i>ibid.</i>
De Betonica,	<i>ibid.</i>
Carminativum,	117
Althææ,	<i>ibid.</i>
De Cicutâ,	118
Dia-Palma,	<i>ibid.</i>
Dia-Chylon simplex,	<i>ibid.</i>
Dia-Chylon cum Gummis,	119
Dia-Phoreticum,	<i>ibid.</i>
Diapompholygos,	120
Divinum seu Manus Dei,	<i>ibid.</i>
Epispasticum,	121
Filii Zachariæ,	<i>ibid.</i>
De Galbano,	<i>ibid.</i>
Gratia Dei,	<i>ibid.</i>
Gryseum seu de Lapide Calaminari,	122
Ad Fracturas Ossium,	<i>ibid.</i>
Magneticum Arsenicale,	123
De Meliloto,	124
De Mucilaginibus,	125
Oxycroceum,	<i>ibid.</i>
Stipticum Paracelsi,	126
De	

C O M P O S I T O R U M.

De Ranis cum Mercurio,	127
Spannadrapium ad Fonticulos,	128
Spannadrapium Marchionis d'Este,	129

Looch sanum & expertum. 46

Mellita.

Mellis Despumatio,	44
Hydromel simplex,	<i>ibid.</i>
Oxymel simplex,	<i>ibid.</i>
Oxymel Scylliticum,	45
Oxymel Marrubiatum,	<i>ibid.</i>
Mel Mercuriale,	<i>ibid.</i>
Rosarum,	<i>ibid.</i>
Diamorum,	<i>ibid.</i>

Olea per expressionem.

Oleum Amygdalarum dulcium &c.	93
Oleum Ovorum,	<i>ibid.</i>

Olea simplicia per infusionem & Decoctionem.

Rosatum,	94
Camomelinum,	<i>ibid.</i>
Liliorum Alborum,	<i>ibid.</i>
Nymphææ,	<i>ibid.</i>
Rutæ,	<i>ibid.</i>
Violarum,	<i>ibid.</i>

INDEX MEDICAMENTORUM.

Olea Composita per infusionem & Decoctionem.

De Capparibus,	94
De Castoreo,	95
Catellorum,	96
Croci,	<i>ibid.</i>
De Euphorbio,	97
Hyperici compositum,	<i>ibid.</i>
Lumbricorum Terrestrium,	98
Mastichinum,	<i>ibid.</i>
Myrtillorum,	<i>ibid.</i>
Mucaginum,	<i>ibid.</i>
Vulpinum,	99

Olea per Destillationem.

Abfynthii,	100
Seminis Anisi,	<i>ibid.</i>
De Baccis Juniperi,	101
Oleum Ceræ,	<i>ibid.</i>
De Lateribus,	102
Myrrhæ per deliquium,	<i>ibid.</i>
Terebinthinæ,	103

Pillulæ.

Aloëphanginæ,	79
Cochiæ,	80
Fœtidæ,	<i>ibid.</i>
De Nitro,	81
Ruffi,	<i>ibid.</i>
Sple-	

COMPOSITORUM.

Spleneticæ,	81
De Cynoglossò,	82
Extractum Catholicon,	ibid.
Laudanum Opiatum,	83
Resina Scammonii,	ibid.

Extractorum conficiendorum Modus generalis. 83

Pulveres Aromatici & alii.

Aromatici Rosati.	58
Dia-Margariti frigidi.	ibid.
Diambrae.	59
Dianthos.	60
Diarrhodonis.	ibid.
Diatragacanthi frigidi.	61
Lætificantis.	ibid.
Dia-curcumæ.	62
Dia-Galangæ.	63
Bezoardicus Magistralis.	ibid.
E Chelis Cancrorum.	64
Cachecticus.	ibid.
Ad casum.	ibid.
Liberans.	65
Contra Abortum.	ibid.
De Gutteta.	66
Haly.	ibid.
Hemophthoicus.	67
Pleuriticus.	ibid.
Reginæ.	ibid.
Stomachicus.	68
Contra Vermes.	ibid.
	Pul-

INDEX MEDICAMENTORUM.

Pulveres solutivi.

Catholicus,	69
Dia-Carthami,	<i>ibid.</i>
Dia Turbith cum Rheo,	<i>ibid.</i>
Hermodaetylatae Venetae,	70
Sennae Montagnanae,	<i>ibid.</i>
Pro Suppositoriis,	<i>ibid.</i>

Rob.

Berberorum,	48
Ceraforum nigrorum,	<i>ibid.</i>
Ribefiorum,	<i>ibid.</i>
Cydoniorum,	<i>ibid.</i>
Sambuci,	<i>ibid.</i>

Syrupi.

Hederæ terrestris,	30
Ex Succo Limonum,	<i>ibid.</i>
Berberis,	<i>ibid.</i>
Granatorum Acidorum,	<i>ibid.</i>
Dulcium,	<i>ibid.</i>
Ribefiorum,	<i>ibid.</i>
De Absynthio,	31
De Althæa,	<i>ibid.</i>
De Artemisia,	32
Capillorum Veneris,	33
De Chicoreo compositus,	34
De Cortice Citri,	<i>ibid.</i>
De Eryfimo,	35
De	

COMPOSITORUM.

De Hyssopo ,	35
De Menthâ ,	36
Myrtinus ,	37
Papaveris albi ,	<i>ibid.</i>
Papaveris Erratici ,	38
De Pæoniâ ,	<i>ibid.</i>
De quinque Radicibus ,	<i>ibid.</i>
De Rosis ficcis ,	39
De Scordio ,	<i>ibid.</i>
De Symphito ,	40
De Stœchade ,	<i>ibid.</i>
Violaceus ,	41
De Chicoreo cum Rheo ,	<i>ibid.</i>
Florum Persicorum ,	42
De Polipodio ,	<i>ibid.</i>
De Rhamno Cathartico ,	43
Regis Solutivus ,	<i>ibid.</i>
Rosarum Solutivus ,	44

Tabella.

Tabellæ Aromatici Rosati ,	50
Diacodii ,	<i>ibid.</i>
Saccharum Perlatum ,	51

Tinctura.

Tinctura Croci ,	22
Cinnamomi ,	<i>ibid.</i>
Castorei ,	<i>ibid.</i>
Gummi Laccæ ,	<i>ibid.</i>
Opii seu Laudanum liquidum ,	<i>ibid.</i>
Salis Tartari ,	23
Succi-	

INDEX MEDICAMENTORUM.

Succini ,	23
Elixir proprietatis ,	<i>ibid.</i>
Essentia Absynthii ,	84

Trochisci.

Agaricus Trochiscatus ,	85
Albi Rhafis ,	<i>ibid.</i>
Alhandal ,	86
Alkekengi ,	<i>ibid.</i>
Bechici nigri ,	87
De Capparibus ,	<i>ibid.</i>
De Carabe ,	88
Cypheos ,	<i>ibid.</i>
Gordonii ,	89
Hedychroi ,	90
De Myrrhâ ,	91
Scyllitici ,	<i>ibid.</i>
De Terra Sigillata ,	92

Unguenta.

Ægyptiacum ,	104
Album ,	<i>ibid.</i>
Althææ ,	<i>ibid.</i>
Apostolorum ,	105
De Arthanitâ ,	<i>ibid.</i>
Aureum ,	106
Basilicon ,	107
Enulatum cum Mercurio ,	<i>ibid.</i>
De Glycirrhiza ,	108
Martiatum ,	109
Neapolitanum ,	110
Nu-	

COMPOSITORUM.

Nutritum ,	III
Populeon ,	ibid.
Rosatum ,	III2
Balsamum Arcæi ,	III3
Balsamum Lucatelli ,	ibid.
Balsamum Viride ,	ibid.

Præparationes Simplicium Medicamentorum.

Cinnabaris ,	III0
Conchæ ,	ibid.
Corallorum ,	III1
Chelorum Cancrorum ,	ibid.
Margaritarum ,	ibid.
Oculorum Cancri &c.	ibid.
Lapidis Lazuli ,	ibid.
Aluminis ustio ,	ibid.
Butyri majalis ,	III2
Cochlearum testarum ,	ibid.
Cornu Cervi Spagyrica præparatio ,	ibid.
Millepedum ,	III3
Opii Correctio ,	ibid.
Plumbi ustio ,	ibid.
Scammonii præparatio ,	ibid.
Tuthiæ ,	III4

Medicamenta Spagyrica.

Crocus Martis adstringens ,	III5
Crocus Martis cum Sulphure præpar.	ibid.
Magisterium Martis aperitivum ,	III6
Tinctura Martis ,	ibid.
Vitrio-	

COMPOSITORUM.

Sal Prunellæ,	148
Oleum Tartari per deliquium,	<i>ibid.</i>
Sal Nitri fixum ejusque liquor.	149

Salis Essentialis conficiendi modus. 149

Spiritus Cornu Cervi,	150
Sal Volatile Cornu Cervi,	<i>ibid.</i>
Sal Volatile & Oleum Succini,	151
Spiritus Salis Armoniaci,	<i>ibid.</i>
Flores Salis Armoniaci,	<i>ibid.</i>
Spiritus Nitri,	152
Spiritus Salis,	<i>ibid.</i>
Spiritus Salis dulcis,	153
Lapis infernalis,	<i>ibid.</i>
Ruptorium Commune,	<i>ibid.</i>
Lapis Medicamentosus Crollii,	<i>ibid.</i>
Aqua Fortis.	154

F I N I S.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911



Vidit & Approbavit hâc
17. Decembris 1739.

N. KERPEN *Pleb.*
& *Canonicus S. S.*
Mich. & Gud. libr.
Censor.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Vol. 2, No. 1
1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1911



